



# Notice d'emploi N° 7732 / 2019

Pour les produits phytosanitaires visés à l'art. 36 de l'ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires  
(ordonnance sur les produits phytosanitaires, RS 916.161)

## Caractéristiques du produit

|                               |                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dénomination spécifique:      | Fongicide                                                                          |
| Formulation:                  | SC suspension concentrée                                                           |
| Teneur en substances actives: | 22.52 % picoxystrobine (250 g/l)                                                   |
| Nom UICPA:                    | methyl (E)-3-methoxy-2-{2-[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxyethyl]phenyl}acrylate |
| Teneur en COV:                | 0 %                                                                                |

## Stockage

Le produit doit être conservé dans l'emballage original, à l'écart des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des médicaments, de façon à ne pas être accessible aux personnes non autorisées.

## Elimination

|                                     |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emballage:                          | Les récipients vides, nettoyés avec soin, doivent être confiés à la voirie pour leur élimination.                                                                   |
| Restes de produits phytosanitaires: | Les restes de produits phytosanitaires doivent être confiés au centre de ramassage de la commune, à un centre de collecte de déchets spéciaux ou au point de vente. |

## Produits commerciaux

### Acanto

|                                                  |                                                                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro d'homologation fédéral: D-5216            | Pays d'origine: Allemagne                                                          |
| Numéro d'homologation étranger: PI 024658-00/001 | Titulaire de l'autorisation étranger: Star Agro Analyse und Handels GmbH, Autriche |

## Autorisé jusqu'au 31.12.2023

| Domaine d'application            | Ravageur                                                                                   | Spécifications d'application                       | (*)     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|
| <b>Grande culture</b>            |                                                                                            |                                                    |         |
| Blé                              | oïdium des céréales                                                                        | Dosage: 1 l/ha<br>Application: stade 31-61 (BBCH). | 1       |
| Blé                              | septorioses foliaires (S. tritici ou S. nodorum)                                           | Dosage: 1 l/ha<br>Application: stade 37-51 (BBCH). | 1       |
| Blé                              | grillures (PLS)                                                                            | Dosage: 1 l/ha<br>Application: stade 39-51 (BBCH)  | 1, 2, 3 |
| Blé, Seigle d'automne, Triticale | rouille brune                                                                              | Dosage: 1 l/ha<br>Application: stade 37-61 (BBCH). | 1       |
| Blé, Triticale                   | rouille jaune                                                                              | Dosage: 1 l/ha<br>Application: stade 31-61 (BBCH). | 1       |
| Blé, Triticale                   | septoriose de l'épi (S. nodorum)                                                           | Dosage: 1 l/ha<br>Application: Stade 51-61 (BBCH). | 1       |
| Colza                            | sclérotiniose                                                                              | Dosage: 1 l/ha<br>Application: stade 61-65 (BBCH). | 1       |
| Orge                             | helminthosporiose de l'orge, oïdium des céréales, rhynchosporiose, rouille naine de l'orge | Dosage: 1 l/ha<br>Application: stade 31-51 (BBCH). | 1       |

**Charges générales / agronomiques:**

- 1 1 traitement par culture au maximum.
- 2 En mélange avec 1 - 1.5 l/ha Chlorothalonil (40% SC).
- 3 PLS = Physiological Leaf Spots

**Indications relatives à la sécurité devant figurer sur l'emballage:****Phrases PPS**

Tenir hors de portée des enfants.

- SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.