



Foglio illustrativo n. 7300 / 2023

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Erbicida
Formulazione:	EC concentrato emulsionato
Tenore di principi attivi:	56.8 % Petoxamide (600 g/l)
Denominazione IUPAC:	2-chloro-N-(2-ethoxyethyl)-N-(2-methyl-1-phenylprop-1-enyl)acetamide

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Successor 600

Numero di omologazione federale: D-7310	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: 025078-61	Titolare dell'autorizzazione estera: Cheminova A/S, Danimarca

Quantum

Numero di omologazione federale: D-7309	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: 025078-00	Titolare dell'autorizzazione estera: Cheminova A/S, Danimarca

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Coltivazione di bacche			
Fragola	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 2 l/ha Applicazione: Prima o immediatamente dopo la piantagione.	1, 2, 3, 4, 5
Orticoltura			
Fagioli	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 2 l/ha Applicazione: In pre-emergenza.	1, 5, 6
Zucca da olio	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 2 l/ha Applicazione: In pre-emergenza.	1, 5, 6, 7
Campicoltura			
Colza	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 1.5 - 2 l/ha Applicazione: Autunno: pre-emergenza fino allo stadio BBCH 14.	1, 5, 8
Pisello proteico	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 2 l/ha Applicazione: In pre-emergenza.	1, 5, 9

Oneri generali / agronomici:

- 3 Raccolta solo l'anno che segue.
- 4 Al più tardi entro fine agosto.
- 5 SPe 3: per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 6 Trattamento al più tardi 3-5 giorni dopo la semina.
- 7 Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).
- 8 SPe 1 - Per proteggere le acque sotterranee non applicare prodotti contenenti Pethoxamid più di 1 volta ogni 2 anni sulla stessa particella in questa coltura.
- 9 In combinazione con Centium 36 CS (0.2-0.25 l/ha).

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 1 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una visiera + un copricapo. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
- 2 In caso di applicazione nelle serre, queste vanno areate a lungo prima di riaccedervi.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:**Frase PF**

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
- SPe 2 Onde proteggere le acque sotterranee evitare i trattamenti nelle zone di protezione delle acque sotterranee (S2 e Sh).