



Foglio illustrativo n. 7394 / 2020

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica: Acaricida
Formulazione: SC sospensione concentrata
Tenore di principi attivi: 15.8 % Acechinocil (164 g/l)
Denominazione IUPAC: 3-dodecyl-1,4-dihydro-1,4-dioxo-2-naphthyl acetate

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi: Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto: Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Kanemite SC

Numero di omologazione federale: A-5598

Numero di omologazione estero: 3129/0

Paese di provenienza: Austria

Titolare dell'autorizzazione estera: Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG, Germania

Acequinocyl 150

Numero di omologazione federale: D-6336

Numero di omologazione estero: GP 025855-00/007

Paese di provenienza: Germania

Titolare dell'autorizzazione estera: Bernbeck LLP, Regno Unito

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Coltivazione di bacche			
Specie di rubus	Eriofidi gallicoli, Ragnetti	Concentrazione: 0.125 % Dosaggio: 1.25 l/ha Applicazione: Dopo il raccolto.	1, 2, 3, 4, 5, 6
Frutticoltura			
Frutta a granelli	Ragnetti	Concentrazione: 0.1125 % Dosaggio: 1.8 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Dopo la fioritura (BBCH 69).	2, 4, 5, 6, 7, 8
Frutta a granelli	Ragnetti	Concentrazione: 0.1125 % Dosaggio: 1.8 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Dopo la fioritura (BBCH 69).	5, 6, 7, 8

Orticoltura

Serra: Cetrioli, Melanzana, Pomodori	Ragnetti	Concentrazione: 0.1 % Termine d'attesa: 3 Giorni	9, 10
Serra: Cetrioli, Melanzana, Pomodori	Ragnetti	Concentrazione: 0.1 % Termine d'attesa: 3 Giorni	2, 3, 4, 9, 10

Coltivazione piante ornam.

Serra: Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), Colture da fiore e piante verdi, Rose	Ragnetti	Concentrazione: 0.125 %	2, 3, 4, 11
Serra: Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), Colture da fiore e piante verdi, Rose	Ragnetti	Concentrazione: 0.125 %	11

Oneri generali / agronomici:

- 1 Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).
- 5 SPe 3: per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.
- 6 Al massimo 1 trattamento per anno e particella.
- 7 Solo in frutteti secondo l'art. 22 dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (RS 910.91, OTerm).
- 8 La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni dell'UFAG.
- 9 Dose massima: 1.25 l/ha.
- 10 Al massimo un 1 trattamento per coltura.
- 11 Al massimo 3 trattamenti per coltura e anno.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 2 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione.
- 3 In caso di applicazione nelle serre, queste vanno areate a lungo prima di riaccedervi.
- 4 Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi).

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:**FraSI PF**

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- A uso esclusivamente professionale. Uso vietato nelle zone d'insediamento.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.