



Foglio illustrativo n. 4764 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Prodotto per la concia delle sementi, Fungicida
Formulazione:	WG granulare idrodispersibile
Tenore di principi attivi:	80 % Tiram (TMTD)
Denominazione IUPAC:	tetramethylthiuram disulfide

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Coltivazione di bacche			
Fragola	Efficacia parziale: Antracnosi della fragola, Septoriosi e marciume della fragola	Concentrazione: 0.3 % Dosaggio: 3 kg/ha Applicazione: Prima della fioritura e dopo il raccolto., Irrorare.	1, 2, 3
Frutticoltura			
Frutta a nocciolo	Bolla del pesco, Vaiolatura della frutta a nocciolo	Concentrazione: 0.2 - 0.3 % Dosaggio: 3.2 - 4.8 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Irrorare.	2, 4, 5
Melo, Pero / Nashi	Ticchiolatura della frutta a granelli	Concentrazione: 0.2 - 0.3 % Dosaggio: 3.2 - 4.8 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Irrorare.	2, 4, 5, 6
Orticoltura			
Cucurbitacee	Mal dello sclerozio	Concentrazione: 0.3 % Applicazione: Applicare mediante spalmatura sui primi focolai d'infezione (vietato irrorare!).	7
Insalate cappuccio	Peronospora della lattuga	Dosaggio: 1.5 - 2.5 kg/ha Applicazione: Irrorare.	2, 3, 8
Orticoltura in generale	Funghi trasmessi dalle sementi	Dosaggio: 2 - 3 g/kg di sementi Applicazione: Concia.	9, 10, 11, 12

Oneri generali / agronomici:

- 1 La dose indicata si riferisce allo stadio "piena fioritura fino all'inizio dell'arrossamento dei frutticini", 4 piante/m², trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha.
- 4 La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha.
- 6 1 - 2 trattamenti sui fiori permettono di ridurre l'infestazione accompagnata da marciume (botrite).
- 8 1 - 2 trattamenti al massimo entro 14 giorni dopo la piantagione. Per l'ultimo trattamento impiegare soltanto una bassa concentrazione.
- 11 Gli imballaggi contenenti materiale da semina conciato devono essere designati con la seguente iscrizione sull'etichetta:
- Sementi conciate. Non ingerire! I residui non devono essere usati come foraggio o alimento, neanche se lavati.
- La denominazione commerciale, il(i) principio(i) attivo(i) e le frasi tipo per precauzioni da prendere del prodotto per la concia delle sementi.
- 12 Da combinare, preferibilmente, con altri principi attivi.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 2 Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto.
- 3 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + una maschera di protezione per le vie respiratorie (P3) + occhiali di protezione. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
- 5 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + occhiali di protezione + una maschera di protezione per le vie respiratorie (P3). Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una visiera + un copricapo. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
- 7 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + occhiali di protezione + una maschera di protezione per le vie respiratorie (P3).
- 9 Nel processo di concia : Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. Insaccamento delle sementi, lavori di pulizia: Indossare inoltre un copricapo + una visiera + una maschera di protezione per le vie respiratorie (P2).
- 10 Le etichette dei sacchi contenenti sementi conciate devono recare le seguenti indicazioni: "Nell'aprire i sacchi di sementi e nel caricare la seminatrice è necessario indossare guanti di protezione. Evitare la formazione e l'inalazione di polvere."

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:**Frasi PF**

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.