



Foglio illustrativo n. 8263 / 2024

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica: Fungicida
Formulazione: EC concentrato emulsionato
Tenore di principi attivi: 9.44 % Protioconazolo (100 g/l); 4.72 % Fluoxastrobin (50 g/l); 3.77 % Bixafen (40 g/l)
Denominazione IUPAC: (RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione; (E)-{2-[6-(2-chlorophenoxy)-5-fluoropyrimidin-4-yloxy]phenyl}{5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)methanone O-methyloxime; N-(3',4'-dichloro-5-fluorobiphenyl-2-yl)-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxamide

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi: Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto: Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Variano Xpro

Numero di omologazione federale: D-6130 Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: 007566-00 Titolare dell'autorizzazione estera: Bayer CropScience Deutschland GmbH, Germania

Proflubix

Numero di omologazione federale: D-7448 Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: 007566-00/012 Titolare dell'autorizzazione estera: Agrimotion Deutschland GmbH, Germania

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Campicoltura			
Frumento, Segale autunnale, Spelta	Mal del piede dei cereali	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 30 - 32 (BBCH).	1, 2
Frumento, Segale autunnale, Spelta	Ruggine bruna	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 37 - 61 (BBCH).	1, 2
Frumento, Segale autunnale, Spelta, Triticale	Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum)	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 37 - 61 (BBCH).	1, 2
Frumento, Segale autunnale, Spelta, Triticale	Oidio dei cereali	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH).	1, 2
Orzo	Bruciature fogliari (PLS + RCC), Macchie reticolate dell'orzo, Oidio dei cereali, Rincosporiosi, Ruggine nana dell'orzo	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 31-51 (BBCH).	1, 2

Oneri generali / agronomici:

- 2 Al massimo un 1 trattamento per coltura.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 1 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una maschera di protezione per le vie respiratorie (A2) + occhiali di protezione. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una visiera + un copricapo. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:**Frase PF**

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.