



Foglio illustrativo n. 7608 / 2020

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica: Fungicida
Formulazione: SC sospensione concentrata
Tenore di principi attivi: 41.7 % Tiofanato-metile (500 g/l)
Denominazione IUPAC: dimethyl 4,4'-(o-phenylene)bis(3-thioallophanate)

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi: Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto: Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Thiophanat-methyl 500

Numero di omologazione federale: D-5855 Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: GP 033496-00/017 Titolare dell'autorizzazione estera: Bernbeck LLP, Regno Unito

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Frutticoltura			
Frutta a granelli	Marciume (Botrytis cinerea)	Concentrazione: 0.125 % Dosaggio: 2 l/ha Applicazione: Durante la fioritura.	1, 2, 3, 4, 5
Frutta a granelli	Oidio della mela/pera	Concentrazione: 0.125 % Dosaggio: 2 l/ha Applicazione: Durante la fioritura.	1, 2, 3, 4, 5, 6
Frutta a granelli, Frutta a nocciolo	Monilia dei rami e dei fiori	Concentrazione: 0.125 % Dosaggio: 2 l/ha Applicazione: Durante la fioritura.	1, 2, 3, 4, 5
Melo, Pero / Nashi	Cancro degli alberi da frutta a granelli	Concentrazione: 0.0875 % Dosaggio: 1.4 l/ha Applicazione: Dopo il raccolto (BBCH 93 - 99).	1, 2, 3, 4, 5
Viticultura			
Vite	Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Concentrazione: 0.17 % Dosaggio: 2 l/ha Applicazione: Dalla fioritura al più tardi entro metà agosto.	4, 5, 7, 8, 9, 10, 11

Orticoltura

Serra: Pomodori	Ticchiolatura del pomodoro	Concentrazione: 0.11 % Termine d'attesa: 3 Giorni Applicazione: All'inizio dell'attacco.	5, 12, 13
-----------------	----------------------------	--	-----------

Campicoltura

Frumento, Triticale	Fusariosi della spiga	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Stadi 55 - 69 (BBCH).	12, 13, 14
---------------------	-----------------------	---	------------

Oneri generali / agronomichi:

- 1 SPa 1: Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 2 trattamenti per anno e particella con prodotti dello stesso gruppo di principi attivi.
- 2 La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni dell'UFAG.
- 3 SPe 3: per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.
- 6 Soltanto in combinazione con 0.1% Captan (80%).
- 7 Non trattare su uva da tavola.
- 8 SPe 3: per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.
- 9 La dose indicata si riferisce ad un trattamento nella zona dei grappoli con una quantità standard di poltiglia di 1200 l/ha (base per il calcolo).
- 10 SPa 1: Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 1 trattamento per anno e particella con prodotti dello stesso gruppo di principi attivi.
- 11 Ultimo trattamento all'invaiaura, ma al più tardi a metà agosto.
- 13 Al massimo un 1 trattamento per coltura.
- 14 SPe 3: per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 4 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una visiera + un copricapo. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
- 5 Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto.
- 12 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frazi PF

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.