



Foglio illustrativo n. 7839 / 2023

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica: Insetticida
Formulazione: SC sospensione concentrata
Tenore di principi attivi: 9.26 % spirotetramat (100 g/l)
Denominazione IUPAC: cis-4-(ethoxycarbonyloxy)-8-methoxy-3-(2,5-xylyl)-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2-one

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi: Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto: Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Movento

Numero di omologazione federale: D-7255
Numero di omologazione estero: 008007-00/006
Paese di provenienza: Germania
Titolare dell'autorizzazione estera: STAR Agro Handels GmbH, Austria

Movento Gold

Numero di omologazione federale: I-6470
Numero di omologazione estero: 016822
Paese di provenienza: Italia
Titolare dell'autorizzazione estera: Bayer CropScience S.r.l., Italia

Movento

Numero di omologazione federale: F-5564
Numero di omologazione estero: 2110086
Paese di provenienza: Francia
Titolare dell'autorizzazione estera: Bayer CropScience S.A., Francia

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Coltivazione di bacche			
Fragola	Tarsonemide della fragola	Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Prima della fioritura e dopo il raccolto.	1, 2, 3
Fragola	Afidi	Concentrazione: 0.075 % Dosaggio: 0.75 l/ha Applicazione: Prima della fioritura e dopo il raccolto.	1, 3, 4
Mirtillo	Afidi, Cocciniglie	Concentrazione: 0.075 % Dosaggio: 0.75 l/ha Applicazione: Dopo il raccolto.	3, 4, 5, 6

Ribes nero, Ribes rosso	Cocciniglie	Concentrazione: 0.075 % Dosaggio: 0.75 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane Applicazione: Stadi 69-85 (BBCH).	3, 4, 5, 6
Sambuco nero	Afidi	Concentrazione: 0.075 % Applicazione: Dopo il raccolto.	3, 4, 5, 6
Serra: Fragola	Aleurodidi	Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Prima della fioritura e dopo il raccolto.	1, 3, 4
Specie di ribes	Cocciniglie	Concentrazione: 0.075 % Dosaggio: 0.75 l/ha Applicazione: Dopo il raccolto.	3, 4, 5, 6
Frutticoltura			
Ciliegio	Mosca della ciliegia	Concentrazione: 0.125 % Dosaggio: 2 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane Applicazione: Stadi 81-85 (BBCH).	3, 7, 8
Frutta a granelli	Ragnetti	Concentrazione: 0.09 % Dosaggio: 1.44 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Dopo la fioritura., Stadi 69-81 (BBCH).	3, 4, 7
Frutta a granelli	Afide grigio - rosa del melo, Afide sanguigno del pero, Afide verde degli agrumi	Concentrazione: 0.09 % Dosaggio: 1.44 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Dopo la fioritura (BBCH 69).	3, 4, 7
Frutta a granelli	Afide lanigero del melo	Concentrazione: 0.125 % Dosaggio: 2 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Dopo la fioritura (BBCH 69).	3, 4, 7
Frutta a granelli	Afide verde del melo	Concentrazione: 0.06 % Dosaggio: 0.96 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Dopo la fioritura (BBCH 69).	3, 4, 7
Frutta a granelli, Frutta a nocciolo	Cocciniglie	Concentrazione: 0.09 % Dosaggio: 1.44 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: 2 trattamenti., Dopo la fioritura (BBCH 69).	3, 4, 7, 9
Frutta a granelli, Frutta a nocciolo	Cocciniglie	Concentrazione: 0.125 % Dosaggio: 2 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Dopo la fioritura (BBCH 69)., 1 trattamento.	2, 3, 7, 9
Frutta a nocciolo	Afidi	Concentrazione: 0.06 % Dosaggio: 0.96 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Dopo la fioritura (BBCH 69).	3, 4, 7
Pero	Psille del pero	Concentrazione: 0.125 % Dosaggio: 2 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: 1 trattamento., Dopo la fioritura (BBCH 69).	3, 7, 9
Pero	Psille del pero	Concentrazione: 0.09 % Dosaggio: 1.44 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Dopo la fioritura (BBCH 69)., 2 trattamenti.	3, 7, 9
Viticoltura			
Vite	Cocciniglie, Fillossera della vite	Concentrazione: 0.05 % Dosaggio: 0.8 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane Applicazione: Stadi 69-77 (BBCH). , Trattamento a intervalli di 2 settimane.	3, 6, 10, 11
Orticoltura			
Baby-Leaf (Asteraceae)	Afidi	Dosaggio: 0.75 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane Applicazione: a intervalli di 7 - 14 giorni.	3, 12
Baby-Leaf (Chenopodiaceae)	Afidi	Dosaggio: 0.75 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane Applicazione: a intervalli di 7 - 14 giorni.	3, 12
Cetrioli, Zucche con buccia commestibile	Afidi , Aleurodidi	Concentrazione: 0.075 % Dosaggio: 0.75 l/ha Termine d'attesa: 3 Giorni Applicazione: a intervalli di 7 - 14 giorni.	3, 13
Cima di rapa, Crescione	Afidi	Dosaggio: 0.45 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane Applicazione: a intervalli di 7 - 14 giorni.	3, 6, 12

Fagioli con baccello	Afidi	Dosaggio: 0.75 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane Applicazione: a intervalli di 7 - 14 giorni.	3, 12
Finocchio dolce, Sedano da coste	Afidi , Tripidi	Dosaggio: 0.75 l/ha Termine d'attesa: 7 Giorni Applicazione: All'inizio dell'attacco.	3, 6, 14
Insalate (Asteracee)	Afidi	Dosaggio: 0.75 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane Applicazione: a intervalli di 7 - 14 giorni.	3, 12
Meloni	Aleurodidi	Dosaggio: 0.75 l/ha Termine d'attesa: 3 Giorni Applicazione: a intervalli di 7 - 14 giorni.	3, 13
Meloni	Afidi	Dosaggio: 0.6 l/ha Termine d'attesa: 3 Giorni Applicazione: a intervalli di 7 - 14 giorni.	3, 13
Pieno campo: Aglio, Cipolle, Scalogni	Tripidi	Dosaggio: 0.75 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane Applicazione: a intervalli di 7 - 14 giorni.	3, 15
Pieno campo: Baby-Leaf (Asteraceae)	Afide radicolare della lattuga	Dosaggio: 0.75 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane Applicazione: a intervalli di 7 - 14 giorni.	3, 12
Pieno campo: Carote	Afidi	Dosaggio: 0.45 l/ha Termine d'attesa: 21 Giorni	3, 14, 16
Pieno campo: Carote	Afidi delle radici, Psilla della carota	Dosaggio: 0.75 l/ha Termine d'attesa: 21 Giorni	3, 15, 16, 17
Pieno campo: Cicoria belga	Afide radicolare della lattuga, Afidi	Dosaggio: 0.75 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane Applicazione: a intervalli di 7 - 14 giorni.	3, 12
Pieno campo: Insalate (Asteracee)	Afide radicolare della lattuga	Dosaggio: 0.75 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane Applicazione: a intervalli di 7 - 14 giorni.	3, 12
Pieno campo: Sedano rapa	Afidi delle radici	Dosaggio: 0.75 l/ha Termine d'attesa: 21 Giorni Applicazione: All'inizio dell'attacco.	3, 6, 17, 18
Pieno campo: Sedano rapa	Afidi	Dosaggio: 0.45 l/ha Termine d'attesa: 21 Giorni Applicazione: All'inizio dell'attacco.	3, 6, 14
Pieno campo: Specie di cavoli	Afidi , Aleurodidi	Dosaggio: 0.75 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane	3, 13
Rucola	Afidi	Dosaggio: 0.45 l/ha Termine d'attesa: 1 Settimane Applicazione: Trattamento a intervalli di 2 settimane.	3, 6, 19
Serra: Melanzana, Peperone, Pomodori	Afidi , Aleurodidi	Concentrazione: 0.075 % Dosaggio: 0.75 - 1.5 l/ha Termine d'attesa: 3 Giorni Applicazione: a intervalli di 7 - 14 giorni.	3, 13
Serra: Melanzana, Pomodori	Eriofidi rugginosi	Concentrazione: 0.075 % Dosaggio: 0.75 - 1.5 l/ha Termine d'attesa: 3 Giorni Applicazione: a intervalli di 7 - 14 giorni.	3, 6, 19
Specie di cavoli	Efficacia parziale: Cecidomia del cavolo, Tripidi	Dosaggio: 0.75 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane Applicazione: a intervalli di 7 - 14 giorni.	3, 12
Specie di cavoli [piante giovani]	Afidi , Aleurodidi	Dosaggio: 0.75 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane	3, 13
Spinaci	Afidi	Dosaggio: 0.75 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane Applicazione: a intervalli di 7 - 14 giorni.	3, 12
Campicoltura			
Luppolo	Afidi	Concentrazione: 0.05 % Termine d'attesa: 2 Settimane Applicazione: Dallo stadio BBCH 31.	3, 6, 20, 21
Patate	Afidi	Dosaggio: 0.75 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane Applicazione: Trattamento a intervalli di 2 settimane.	3, 4
Coltivazione piante ornam.			
Alberi e arbusti (al di fuori della foresta)	Afidi	Concentrazione: 0.075 % Applicazione: Trattamento a intervalli di 2 settimane., All'inizio dell'attacco.	3, 11
Colture da fiore e piante verdi	Afidi	Concentrazione: 0.075 % Applicazione: Trattamento a intervalli di 2 settimane., All'inizio dell'attacco.	3, 11

Oneri generali / agronomici:

- 1 La dose indicata si riferisce allo stadio "piena fioritura fino all'inizio dell'arrossamento dei frutticini", 4 piante/m², trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.
- 2 Al massimo 1 trattamento per anno e particella.
- 4 Al massimo 2 trattamenti per anno e particella.
- 5 La dose indicata si riferisce allo stadio "allegagione (50 - 90% delle infiorescenze hanno frutti visibili)", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.
- 6 Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).
- 7 La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.
- 8 Al massimo 2 trattamenti per anno e particella.
Nel caso di 1 trattamento: trattamento subito prima dell'invasiatura ed in seguito dopo ca. 7 giorni trattare con un altro prodotto autorizzato contro la mosca della ciliegia.
Nel caso di 2 trattamenti: primo trattamento subito prima dell'invasiatura ed il secondo dopo 10 giorni.
- 9 Un solo trattamento con la dose più elevata o due trattamenti con la dose più bassa.
- 10 La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m²/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.
- 11 Al massimo 2 trattamenti per anno.
- 12 Al massimo 2 trattamenti per coltura.
- 13 Al massimo 3 trattamenti per coltura.
- 14 Al massimo 2 trattamenti per coltura con un intervallo di 14 giorni.
- 15 Al massimo 4 trattamenti per coltura.
- 16 Trattare quando la soglia di tolleranza è superata.
- 17 Trattamenti a intervalli di 4 giorni.
- 18 Al massimo 4 trattamenti per coltura e anno.
- 19 1-2 trattamenti per coltura e anno.
- 20 Per un quantitativo di base di acqua di 3000 l/ha.
- 21 Al massimo 1 trattamento per anno.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 3 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + un copricapo. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:**Frase PF**

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.