



Foglio illustrativo n. 6945 / 2020

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Insetticida
Formulazione:	SC sospensione concentrata
Tenore di principi attivi:	40.4 % Tiacloprid (480 g/l)
Denominazione IUPAC:	N-{3-[(6chloro-3-pyridinyl)methyl]-1,3-thiazolan-2-yliden}cyanamide

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Calypso

Numero di omologazione federale: F-5402	Paese di provenienza: Francia
Numero di omologazione estero: 2060133	Titolare dell'autorizzazione estera: Bayer CropScience S.A.,Francia

Tiapid

Numero di omologazione federale: D-4602	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: PI 024714-00/028	Titolare dell'autorizzazione estera: Menora GmbH,Austria

Thiacloprid 480

Numero di omologazione federale: D-6311	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: GP 024714-00/049	Titolare dell'autorizzazione estera: Bernbeck LLP,Regno Unito

Calypso 480SC

Numero di omologazione federale: D-5224	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: PI 004714-00/039	Titolare dell'autorizzazione estera: Star Agro Analyse und Handels GmbH,Austria

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Coltivazione di bacche			
Aronia nera	Afidi , Cocciniglie del genere lecanio	Concentrazione: 0.02 % Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 2, 3, 4
Fragola	Afidi , Antonomo delle fragole o dei lamponi	Concentrazione: 0.02 % Dosaggio: 0.2 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 3, 5, 6, 7

Lampone	Drosophila suzukii	Concentrazione: 0.02 % Dosaggio: 0.2 l/ha Termine d'attesa: 3 Giorni Applicazione: Stadi 85-89 (BBCH)	1, 2, 3, 8
Lampone	Afidi , Autonomo delle fragole o dei lamponi, Verme del lampone	Concentrazione: 0.02 % Dosaggio: 0.2 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 2, 3, 5, 8
Mini-Kiwi	Afidi , Cocciniglie del genere lecanio	Concentrazione: 0.02 % Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 2, 3, 4
Mirtillo	Afidi , Cocciniglie del genere lecanio	Concentrazione: 0.02 % Dosaggio: 0.2 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 2, 3, 4, 9
Mora	Drosophila suzukii	Concentrazione: 0.02 % Dosaggio: 0.2 l/ha Termine d'attesa: 3 Giorni Applicazione: Stadi 85-89 (BBCH)	1, 2, 3, 10
Mora	Afidi , Autonomo delle fragole o dei lamponi	Concentrazione: 0.02 % Dosaggio: 0.2 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 2, 3, 5, 10
Sambuco nero	Afidi	Concentrazione: 0.02 % Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 2, 3, 4
Specie di ribes	Afidi , Cocciniglie del genere lecanio	Concentrazione: 0.02 % Dosaggio: 0.2 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 2, 3, 4, 9
Frutticoltura			
Albicocco	psilla del prugno	Concentrazione: 0.02 % Dosaggio: 0.32 l/ha Applicazione: Stadi 03-59 (BBCH).	3, 11, 12, 13, 14
Castagno	Balanino delle castagne, Carpocapsa delle castagne, Tortrice delle castagne	Concentrazione: 0.025 % Dosaggio: 0.4 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	3, 4, 12, 13, 14
Ciliegio	Mosca della ciliegia	Concentrazione: 0.02 % Dosaggio: 0.32 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane	3, 12, 13, 14, 15
Ciliegio	Autonomo del ciliegio	Concentrazione: 0.02 % Dosaggio: 0.32 l/ha Applicazione: Dopo la fioritura (BBCH 69 - 72).	3, 12, 13, 14
Cotogno, Pero / Nashi	Carpocapsa delle mele	Concentrazione: 0.025 % Dosaggio: 0.4 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: In estate.	3, 12, 13, 14
Frutta a granelli	Minatrici	Concentrazione: 0.02 % Dosaggio: 0.32 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	3, 4, 12, 13, 14
Frutta a granelli, Frutta a nocciolo	Afidi Effetti secondari: Falene	Concentrazione: 0.02 % Dosaggio: 0.32 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	3, 12, 13, 14, 16
Melo	Carpocapsa delle mele Effetti secondari: Piccola tortrice dei frutti	Concentrazione: 0.025 % Dosaggio: 0.4 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: In estate.	3, 12, 13, 14
Melo	Autonomo del melo	Concentrazione: 0.02 % Dosaggio: 0.32 l/ha Applicazione: Al germogliamento (BBCH 52 - 53).	3, 12, 13, 14
Melo, Pero / Nashi, Prugno/Susino	Tentredini	Concentrazione: 0.02 % Dosaggio: 0.32 l/ha Applicazione: Alla fine della fioritura (BBCH 69 - 71).	3, 12, 13, 14
Nocciolo	Afidi , Balanino delle nocciuole	Concentrazione: 0.025 % Dosaggio: 0.4 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	3, 4, 12, 13, 14
Noce comune	Carpocapsa delle mele, Mosca della noce	Concentrazione: 0.025 % Dosaggio: 0.4 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	3, 4, 12, 13, 14
Pero / Nashi	Tentredini	Concentrazione: 0.02 % Dosaggio: 0.32 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	3, 4, 12, 13, 14
Prugno/Susino	Tortrice delle susine	Concentrazione: 0.025 % Dosaggio: 0.4 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	3, 12, 13, 14
Campicoltura			
Colza	Meligete della colza, Punteruolo delle siliquie delle crocifere	Dosaggio: 0.2 l/ha Applicazione: Fino allo stadio fine sviluppo dei bottoni fiorali. (BBCH 59).	1, 3, 7

Patate	Dorifora della patata	Dosaggio: 0.1 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Trattamento a intervalli di 2 settimane.	1, 7, 17, 18
Coltivazione piante ornam.			
Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), Colture da fiore e piante verdi	Afidi , Cocciniglia virgola, Cocciniglie cotonose, Cocciniglie del genere lecanio	Concentrazione: 0.02 %	3, 12, 14, 19
Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), Colture da fiore e piante verdi, Rose	Aleurodidi	Concentrazione: 0.03 %	3, 12, 14, 19
Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), Colture da fiore e piante verdi, Rose	Oziorinchi	Dosaggio: 6 ml/100 l substrato Applicazione: Trattamento per immersione (drench).	12, 19, 20, 21
Rose	Afidi , Cocciniglia virgola, Cocciniglie del genere lecanio	Concentrazione: 0.02 %	3, 12, 14, 19

Oneri generali / agronomici:

- 2 SPE 3: Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni dell'UFAG.
- 3 Al massimo 2 trattamenti per anno e particella con prodotti dello stesso gruppo di principi attivi.
- 4 Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).
- 5 Applicazione poco prima della fioritura. Ripetere l'applicazione in caso di volo abituale dell'Antonomo.
- 6 La dose indicata si riferisce allo stadio "piena fioritura fino all'inizio dell'arrossamento dei frutticini". 4 piante/m², trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni dell'UFAG.
- 7 SPE 3: Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva e per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri dalle acque superficiali.
- 8 Per i lamponi estivi la dose indicata si riferisce allo stadio "inizio fioritura fino a 50% dei fiori aperti", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha.
Per i lamponi autunnali la dose si riferisce ad una siepe di 150 - 170 cm d'altezza, trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha.
La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni dell'UFAG.
- 9 La dose indicata si riferisce allo stadio "allegagione (50 - 90% delle infiorescenze hanno frutti visibili)", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni dell'UFAG.
- 10 Per le more la dose indicata si riferisce allo stadio "inizio fioritura fino a 50% dei fiori aperti", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni dell'UFAG.
- 11 Al massimo 1 trattamento per anno e particella.
- 13 La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni dell'UFAG.
- 14 SPE 3: Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni dell'UFAG.
- 15 2 trattamenti a intervalli di 10-14 giorni. 1° trattamento poco prima dell'invasatura.
- 16 Effetto secondario sulle falene: solo se applicato direttamente prima o dopo la fioritura.
- 17 Al massimo 3 trattamenti per coltura.
- 18 Trattamenti a intervalli di 2 settimane.
- 20 Solamente per piante in vaso e in container.
- 21 Diluire 6 ml in 10 l di acqua e in seguito annaffiare (la poltiglia è sufficiente per 100 l di substrato).

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 1 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi.
- 12 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
- 19 Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frasi PF

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.