



Foglio illustrativo n. 7108 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Erbicida
Formulazione:	SL concentrato solubile in acqua
Tenore di principi attivi:	34.8 % MCPB (400 g/l) [pari a 38.1 % MCPB di sale di sodio (438 g/L)]
Denominazione IUPAC:	4-(4-chloro-o-tolyloxy)butyric acid

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Tropotox

Numero di omologazione federale: A-3611	Paese di provenienza: Austria
Numero di omologazione estero: 1052/0	Titolare dell'autorizzazione estera: Bayer Austria GmbH Geschäftsbereich für Pflanzenschutz, Austria

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Coltivazione di bacche			
Lampone, Ribes nero, Ribes rosso	Convolvulaceae	Concentrazione: 0.4 % Dosaggio: 4 l/ha Applicazione: Dopo la lignificazione dei germogli annuali.	1
Orticoltura			
Piselli senza baccello	Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe)	Dosaggio: 3.5 - 4 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	1
Campicoltura			
Cereali [con sementi di trifoglio], Patate da tavola e da foraggio, Pisello proteico	Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe)	Dosaggio: 3.5 - 4 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 2
Miscela trifoglio-graminacee (prati artificiali)	Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe)	Dosaggio: 3.5 - 4 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 3
Prati e pascoli	Specie di romice	Dosaggio: 4 - 6 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Dopo l'emergenza della semina.	1, 3

Prati e pascoli	Specie di ranuncoli	Dosaggio: 4 - 6 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 3
Prati e pascoli	Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe)	Dosaggio: 3.5 - 4 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Dopo l'emergenza della semina.	1, 3
Coltivazione piante ornam.			
Alberi e arbusti (al di fuori della foresta)	Convolvulaceae, Romice comune [Piante giovani], Specie di cardi	Concentrazione: 0.4 % Dosaggio: 4 l/ha	1, 4, 5, 6

Oneri generali / agronomici:

- 2 Non applicare su patate da semina.
- 3 Pascolo o sfalcio (foraggio fresco o conservato) al più presto 3 settimane dopo il trattamento. Eccezione: per gli animali non in lattazione il termine di attesa è di 2 settimane.
- 4 Trattare conifere e tuie soltanto dopo la maturazione dei germogli dell'anno.
- 5 Trattare soltanto i focolai di malerbe.
- 6 Indicare le colture e la loro tollerabilità.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 1 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frazi PF

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.