



Foglio illustrativo n. 7165 / 2024

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Erbicida
Formulazione:	EC concentrato emulsionato
Tenore di principi attivi:	25.2 % Clethodim (240 g/l)
Denominazione IUPAC:	(+/-)-2-[(E)-1-[(E)-3-chloroallyloxyimino]propyl]-5-[2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-enone

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Centurion 240 Neo

Numero di omologazione federale: I-7451	Paese di provenienza: Italia
Numero di omologazione estero: 16461	Titolare dell'autorizzazione estera: Arysta Lifescience, Francia

Select

Numero di omologazione federale: I-6448	Paese di provenienza: Italia
Numero di omologazione estero: 008796	Titolare dell'autorizzazione estera: Arysta Lifescience, Francia

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Coltivazione di bacche			
Fragola	Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 0.5 l/ha Applicazione: Prima della fioritura e dopo il raccolto.	1, 2, 3, 4
Fragola	Gramigna	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Prima della fioritura e dopo il raccolto.	1, 3, 4, 5
Frutticoltura			
Frutta a granelli	Gramigna	Dosaggio: 1 l/ha	1, 3, 5
Frutta a granelli	Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 0.5 l/ha	1, 2, 3
Viticultura			
Vite	Gramigna	Dosaggio: 1 l/ha	1, 3, 5
Vite	Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 0.5 l/ha	1, 2, 3

Orticoltura

Alloro , Dragoncello, Erba cipollina, Prezzemolo, Rosmarino, Salvia, Timo	Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 60 Giorni Applicazione: Dopo la piantagione, in post-emergenza, dopo il germogliamento o in colture installate.	1, 2, 3, 4, 6
Asparagi [Giovani piantagioni]	Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 0.75 l/ha Applicazione: A partire dall'anno di piantagione (BBCH 12-19).	1, 3, 5, 6, 7, 8
Asparagi [Piantagioni in produzione]	Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 0.75 l/ha Applicazione: Dopo il periodo del taglio (BBCH 12-19).	1, 3, 5, 6, 7, 8
Barbabietola	Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 60 Giorni Applicazione: Dopo l' emergenza.	1, 2, 3, 6, 9
Barbabietola	Gramigna	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 60 Giorni Applicazione: Dopo l' emergenza.	1, 3, 5, 6, 9
Carote	Gramigna	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 8 Settimane Applicazione: In post-emergenza.	1, 3, 5
Carote	Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 8 Settimane Applicazione: In post-emergenza.	1, 2, 3
Cavoli a testa	Gramigna	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 4 Settimane Applicazione: In post-emergenza.	1, 3, 5
Cavoli a testa	Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 4 Settimane Applicazione: In post-emergenza.	1, 2, 3
Cipolle, Pomodori	Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 8 Settimane Applicazione: In post-emergenza.	1, 2, 3
Cipolle, Pomodori	Gramigna	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 8 Settimane Applicazione: In post-emergenza.	1, 3, 5
Fagioli	Gramigna	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: In post-emergenza.	1, 3, 5, 10
Fagioli	Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 0.5 l/ha Applicazione: In post-emergenza.	1, 2, 3, 10
Pastinaca	Gramigna	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 40 Giorni Applicazione: Stadi 12-19 (BBCH).	1, 3, 5, 6, 9
Pastinaca	Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 40 Giorni Applicazione: Stadi 12-19 (BBCH).	1, 2, 3, 6, 9
Pieno campo: Patata dolce	Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 60 Giorni	1, 2, 3, 6, 9
Piselli senza baccello	Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 0.5 l/ha Applicazione: Stadi 12-19 (BBCH).	1, 2, 3, 9
Porro	Gramigna	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 4 Settimane Applicazione: In post-emergenza.	1, 3, 5
Porro	Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 4 Settimane Applicazione: In post-emergenza.	1, 2, 3
Prezzemolo tuberoso	Gramigna	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 40 Giorni Applicazione: Stadi 12-19 (BBCH).	1, 3, 5, 6, 9, 11
Prezzemolo tuberoso	Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 40 Giorni Applicazione: Stadi 12-19 (BBCH).	1, 2, 3, 6, 9, 11
Rafano rusticana / Ramolaccio	Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 0.4 l/ha Termine d'attesa: 40 Giorni Applicazione: Stadi 12-19 (BBCH).	1, 2, 3, 6, 9, 11
Rafano rusticana / Ramolaccio	Gramigna	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 40 Giorni Applicazione: Stadi 12-19 (BBCH).	1, 3, 5, 6, 9, 11
Ramolaccio	Gramigna	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 40 Giorni Applicazione: Stadi 12-19 (BBCH).	1, 3, 5, 6, 9
Ramolaccio	Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 0.4 l/ha Termine d'attesa: 40 Giorni Applicazione: Stadi 12-19 (BBCH).	1, 2, 3, 6, 9
Rapa di Brassica rapa e B. napus	Gramigna	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 40 Giorni Applicazione: Stadi 12-19 (BBCH).	1, 3, 5, 6, 9

Rapa di Brassica rapa e B. napus	Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 0.4 l/ha Termine d'attesa: 40 Giorni Applicazione: Stadi 12-19 (BBCH).	1, 2, 3, 6, 9
Scalogni	Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 0.4 l/ha Termine d'attesa: 56 Giorni Applicazione: Stadi 12-18 (BBCH).	1, 2, 3, 6, 9
Scalogni	Gramigna	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 56 Giorni Applicazione: Stadi 12 (BBCH).	1, 3, 5, 6, 9
Scorzonera	Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 0.5 l/ha Applicazione: Allo stadio di 1- fino a 2- foglie della coltura.	1, 2, 3, 6, 9
Campicoltura			
Barbabietole da foraggio e da zucchero, Patate	Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 0.5 l/ha	1, 2, 3
Barbabietole da foraggio e da zucchero, Patate	Gramigna	Dosaggio: 1 l/ha	1, 3, 5
Colza, Girasole, Pisello proteico, Soia	Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 0.5 l/ha	1, 2, 3, 9
Girasole	Gramigna	Dosaggio: 1 l/ha	1, 3, 5, 9
Lino	Gramigna	Dosaggio: 1 l/ha	1, 3, 5, 6
Lino	Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 0.5 l/ha	1, 2, 3, 6
Papavero	Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 0.5 l/ha	1, 2, 3, 6, 9
Tabacco	Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 0.5 l/ha Applicazione: Immediatamente dopo la piantagione.	1, 2, 3, 6, 9
Trifoglio per la produzione di sementi	Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 0.75 l/ha	1, 3, 5, 6, 9
Coltivazione piante ornam.			
Alberi e arbusti (al di fuori della foresta) [in vivai]	Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 0.5 l/ha	1, 2, 3, 6, 7, 8

Oneri generali / agronomici:

- Non utilizzare in combinazione con un adesivo o un agente umidificante contenente lecitina di soia.
- SPe 3: per proteggere le piante non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- Al massimo 1 trattamento per coltura e anno.
- SPe 3: per proteggere le piante non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).
- Al massimo 1 trattamento per anno e particella.
- Trattamento sotto il fogliame della coltura.
- Al massimo un 1 trattamento per coltura.
- Ultimo trattamento: prima della fioritura.
- Per evitare problemi di fitotossicità nella coltura, si consiglia di testare alcune piante prima di trattare l'intero campo.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + occhiali di protezione o una visiera.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frasi PF

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
- SPe 2 Onde proteggere le acque sotterranee evitare i trattamenti nelle zone di protezione delle acque sotterranee (S2 e Sh).