



Foglio illustrativo n. 7760 / 2024

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fungicida
Formulazione:	WG granulare idrodispersibile
Tenore di principi attivi:	50 % Tebuconazolo ; 25 % Trifloxystrobin
Denominazione IUPAC:	(RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol; (E,E)-methoxyimino-{2-[1-(3-trifluoromethyl-phenyl)-ethylideneaminooxymethyl]-phenyl}-acetic acid methyl ester

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Flint max

Numero di omologazione federale: A-5589	Paese di provenienza: Austria
Numero di omologazione estero: 2980-1	Titolare dell'autorizzazione estera: STAR Agro Handels GmbH,Austria

Flint Max

Numero di omologazione federale: I-6092	Paese di provenienza: Italia
Numero di omologazione estero: 013689	Titolare dell'autorizzazione estera: Bayer S.p.A.,Italia

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Orticoltura			
Asparagi	Bruciatura delle foglie dell'asparago, Ruggine dell'asparago	Dosaggio: 0.4 kg/ha Applicazione: Giovani piantagioni e piantagioni in produzione (dopo il taglio).	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Carote	Altenariosi delle carote, Mal dello sclerozio, Oidio delle carote	Dosaggio: 0.3 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: All'inizio dell'attacco.	2, 3, 5, 6, 8, 9, 10
Cavoli a infiorescenza	Maculatura anulare del cavolo, Maculatura anulare nera del cavolo, Oidio delle crocifere, Pyrenopeziza brassicae, Ruggine bianca	Dosaggio: 0.4 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: All'inizio dell'attacco.	2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13
Cavoli a testa, Cavoli di Bruxelles	Maculatura anulare del cavolo, Maculatura anulare nera del cavolo, Oidio delle crocifere, Pyrenopeziza brassicae, Ruggine bianca	Dosaggio: 0.4 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: All'inizio dell'attacco.	2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13
Cicoria belga	Alternaria spp., Oidio delle Asteracee, ruggini su insalate (Asteraceae) e su cicoria belga	Dosaggio: 0.4 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13

Cima di rapa	Maculatura anulare nera del cavolo	Dosaggio: 0.4 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: All'inizio dell'attacco.	2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13
Pastinaca	Alternariosi delle carote, Mal dello sclerozio, Oidio delle carote	Dosaggio: 0.3 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: A partire dall'inizio dell'attacco.	2, 3, 6, 8, 11, 14
Pieno campo: Angurie, cetrioli per conserva, Meloni, Zucca da olio, Zucche (buccia non commestibile), Zucche con buccia commestibile	Cancro gommoso, Oidio delle Cucurbitacee	Dosaggio: 0.3 kg/ha Termine d'attesa: 3 Giorni	2, 3, 5, 6, 8, 9
Porro	Alternariosi (Alternaria porri), Ruggine delle Agliacee (Puccinia allii) Efficacia parziale: Peronospora del porro, Pleospora herbarum	Dosaggio: 0.4 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: All'inizio dell'attacco.	2, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 15
Scorzonera	Oidio delle Asteracee, Ruggine bianca	Dosaggio: 0.4 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: A partire dall'inizio dell'attacco.	1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14
Serra: Cetrioli	Cancro gommoso, Oidio delle Cucurbitacee	Concentrazione: 0.03 % Dosaggio: 0.3 kg/ha Termine d'attesa: 3 Giorni	2, 3, 5, 9, 10, 16
Serra: Melanzana	Oidio delle solanacee	Concentrazione: 0.03 % Termine d'attesa: 3 Giorni	2, 3, 5, 9, 10, 16
Serra: Peperone	Oidio delle solanacee	Concentrazione: 0.02 % Termine d'attesa: 3 Giorni	2, 3, 5, 9, 10, 16
Serra: Pomodori	Oidio delle solanacee	Concentrazione: 0.03 % Termine d'attesa: 3 Giorni	2, 3, 5, 9, 10, 16

Oneri generali / agronomici:

- 1 SPe 3: Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione.
- 2 Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 4 Al massimo 3 trattamenti per particella e anno con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente la sostanza attiva tebuconazolo.
- 5 Informazione affinché terze persone non entrino nella particella.
- 7 SPe 3: per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 8 SPe 3: Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione.
- 9 Al massimo 3 trattamenti per coltura con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente la sostanza attiva tebuconazolo.
- 11 Al massimo 2 trattamenti per coltura con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente la sostanza attiva tebuconazolo.
- 12 SPe 1 - Per proteggere le acque sotterranee, è possibile effettuare al massimo 2 applicazioni di prodotti contenenti trifloxystrobin per coltura e anno.
- 13 SPe 3: per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 14 Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).
- 15 SPe 1 - Per proteggere le acque sotterranee, 1 applicazione al massimo con un prodotto contenente trifloxystrobin per coltura e anno.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 3 Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi).
- 6 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera.
- 10 In caso di applicazione nelle serre, queste vanno areate a lungo prima di riaccedervi.
- 16 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera.
Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi.
I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frasi PF

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
- SPe 2 Onde proteggere le acque sotterranee evitare i trattamenti nelle zone di protezione delle acque sotterranee (S2 e Sh).