Foglio illustrativo n. 7808 / 2020

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Insetticida
Formulazione:	SG granulare solubile in acqua
Tenore di principi attivi:	0.95 % emamectina benzoato
Denominazione IUPAC:	(4''R)-4''-deoxy-4''-(methylamino)avermectin B1 (CAS name)

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Affirm

Numero di omologazione federale: I-5657	Paese di provenienza: Italia
Numero di omologazione estero: 13389	Titolare dell'autorizzazione estera: Syngenta Crop Protection S.P.A.,Italia

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Frutticoltura			
Albicocco, Pesco/pesco noce	Carpocapsa delle mele, tignola del pesco, Tortrice orientale del pesco	Concentrazione: 0.2 % Dosaggio: 3.2 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: A partire dall'inizio della schiusa delle larve.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Frutta a granelli	Falene, Tortrici ricamatrici	Concentrazione: 0.2 % Dosaggio: 3.2 kg/ha Applicazione: Prefioritura o postfioritura (BBCH 57-59 o 69-71).	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Frutta a granelli	Carpocapsa delle mele, Piccola tortrice dei frutti, Tortrici ricamatrici	Concentrazione: 0.2 % Dosaggio: 3.2 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: A partire dall'inizio della schiusa delle larve.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Noce comune	Carpocapsa delle mele	Concentrazione: 0.2 % Dosaggio: 3.2 kg/ha Termine d'attesa: 3 Giorni Applicazione: A partire dall'inizio della schiusa delle larve.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Prugno/Susino	Tortrice delle susine	Concentrazione: 0.2 % Dosaggio: 3.2 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Orticoltura			
Cavoli a infiorescenza, Cavoli a testa, Cavoli di Bruxelles, Cavoli fogliacei	Cavolaie, Nottue (defogliatrici), Tignola delle Crocifere	Concentrazione: 0.15 % Dosaggio: 1.5 kg/ha Termine d'attesa: 1 Settimane	2, 8, 9, 10
Cucurbitacee	Nottue (defogliatrici)	Concentrazione: 0.15 % Dosaggio: 1.5 kg/ha Termine d'attesa: 3 Giorni	2, 8, 9, 10
Pomodori	Tuta absoluta	Concentrazione: 0.15 % Dosaggio: 1.5 kg/ha Termine d'attesa: 3 Giorni	2, 8, 9, 10
Campicoltura			
Pisello proteico	Nottue (defogliatrici), Tortrice del pisello	Dosaggio: 1.5 kg/ha Applicazione: A prtire dall'inizio dell'attacco.	2, 8, 9, 10
Coltivazione piante ornam.			
Bosso (Buxus)	Piralide del bosso	Concentrazione: 0.2 % Applicazione: A prtire dall'inizio dell'attacco.	2, 4, 8, 11

Oneri generali / agronomichi:

2 SPa 1: Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti emamectina benzoato più di due volte per anno e particella.

3 La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni dell'UFAG.

4 SPe 3: Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni dell'UFAG.

5 SPe 3: per proteggere artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 100 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.

6 Solo in frutteti secondo l'art. 22 dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (RS 910.91, OTerm).

7 SPe 8 - Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi). Può venir utilizzato solo impiegando un sistema che riduca la deriva di almeno il 75%. Nella piantagione così come in una fascia-tampone circostante di una larghezza di 3 m, le colture intercalari e le malerbe in fiore devono essere eliminate prima del trattamento (il giorno prima sfalciare/trinciare l'erba).

8 SPe 8 - Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi).

9 SPe 3: per proteggere artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.

10 SPe 3: Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni dell'UFAG.

11 Pe 3: per proteggere artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.

Oneri per la protezzione dell'utilizzatore:

1 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frasi PF

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.