



Foglio illustrativo n. 7358 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Erbicida
Formulazione:	SL concentrato solubile in acqua
Tenore di principi attivi:	37.6 % Glifosato (450 g/l) [Pari a 50.8% di Glifosato - isopropile sale di ammonio (607 g/l)]
Denominazione IUPAC:	N-(phosphonomethyl)glycine

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Coltivazione di bacche			
Mora	Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 - 7.5 l/ha	1, 2, 3, 4
Mora	Dicotiledoni annuali (malerbe), Gramigna, Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 1.5 - 2.5 l/ha	1, 2, 3, 4
Frutticoltura			
Frutta a granelli, Frutta a nocciolo	Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 - 7.5 l/ha	1, 2, 3, 4
Frutta a granelli, Frutta a nocciolo	Dicotiledoni annuali (malerbe), Gramigna, Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 1.5 - 2.5 l/ha	1, 2, 3, 4
Viticultura			
Vite in produzione	Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 - 7.5 l/ha	1, 2, 3, 4
Vite in produzione	Dicotiledoni annuali (malerbe), Gramigna, Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 1.5 - 2.5 l/ha	1, 2, 3, 4
Orticoltura			
Maggese	Dicotiledoni annuali (malerbe), Gramigna, Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 1.5 - 2.5 l/ha	1, 3, 4, 5
Maggese	Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 - 7.5 l/ha	1, 3, 4, 5

Campicoltura

Maggese	Dicotiledoni annuali (malerbe), Gramigna, Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 1.5 - 2.5 l/ha	1, 3, 4, 5
Maggese	Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 - 7.5 l/ha	1, 3, 4, 5
Mais	Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 - 7.5 l/ha	1, 3, 4, 6, 7
Mais	Dicotiledoni annuali (malerbe), Gramigna, Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 1.5 - 2.5 l/ha	1, 3, 4, 6, 7
Prati e pascoli	Dicotiledoni (malerbe), Monocotiledoni (malerbe)	Concentrazione: 0.5 - 1 % Applicazione: Trattamento pianta per pianta con vaporizzatore a zaino.	1, 3, 4, 8
Prati e pascoli	Dicotiledoni (malerbe), Monocotiledoni (malerbe)	Dosaggio: 3 - 7.5 l/ha Applicazione: Trattamento su tutta la superficie prima della risemina.	1, 3, 4, 5
Prati e pascoli	Dicotiledoni (malerbe), Monocotiledoni (malerbe)	Concentrazione: 5 - 7.5 % Applicazione: Trattamento pianta per pianta mediante vaporizzatore e barra a corda umettante.	1, 3, 4, 8

Coltivazione piante ornam.

Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), Rose	Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 - 7.5 l/ha	1, 2, 3, 4
Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), Rose	Dicotiledoni annuali (malerbe), Gramigna, Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 1.5 - 2.5 l/ha	1, 2, 3, 4
Maggese	Dicotiledoni annuali (malerbe), Gramigna, Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 1.5 - 2.5 l/ha	1, 3, 4, 5
Maggese	Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 - 7.5 l/ha	1, 3, 4, 5

Selvicoltura

Vivai forestali	Dicotiledoni annuali (malerbe), Gramigna, Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 1.5 - 2.5 l/ha	1, 2, 3, 4
Vivai forestali	Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 - 7.5 l/ha	1, 2, 3, 4

Superfici per la promozione della biodiversità (SPB) secondo OPD

Superficie coltiva aperta	Convolvulaceae, Gramigna, Romice comune, Stoppione	Concentrazione: 5 - 7.5 % Applicazione: Con vaporizzatori manuali (senza vaporizzatore a zaino).	1, 3, 4, 9
Superficie coltiva aperta	Convolvulaceae, Gramigna, Romice comune, Stoppione	Concentrazione: 0.5 - 1 % Applicazione: Con vaporizzatore a zaino.	1, 3, 4, 9
Superficie inerbita	Romice comune, Stoppione	Concentrazione: 5 - 7.5 % Applicazione: Con vaporizzatori manuali (senza vaporizzatore a zaino).	1, 3, 4, 8, 9
Superficie inerbita	Romice comune, Stoppione	Concentrazione: 0.5 - 1 % Applicazione: Con vaporizzatore a zaino.	1, 3, 4, 8, 9

Oneri generali / agronomici:

- Trattamento al più tardi entro fine agosto. Non possono essere trattate le parti vegetali verdi e le vigne con sistemi di potatura corta (gobelet, cordoni permanenti, eccetera).
- Non devono esserci precipitazioni durante almeno 6 ore dopo il trattamento.
- Trattamento al più tardi fino a 2 settimane prima della semina o della piantagione.
- La dose si riferisce alla superficie effettiva da trattare.
- Trattamento della superficie non lavorata tra le file durante la semina a bande fresate.
- Pascolo o sfalcio (foraggio fresco o conservato) al più presto 3 settimane dopo il trattamento. Eccezione: per gli animali non in lattazione il termine di attesa è di 2 settimane.
- Per il trattamento pianta per pianta secondo l'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD).

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- Nel caso dell'uso di un vaporizzatore o di un vaporizzatore a zaino, è necessario indossare guanti di protezione durante la preparazione della poltiglia.
- Durante la preparazione della poltiglia: Indossare occhiali di protezione o una visiera.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frasi PF

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.