



Decisione generale concernente l'omologazione di un prodotto fitosanitario intesa a fronteggiare una situazione d'emergenza

del 26 gennaio 2026

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,
visto l'articolo 56 dell'ordinanza del 20 agosto 2025¹ sui prodotti fitosanitari,
decide:*

I prodotti fitosanitari

Audienz (W-6020, 480 g/l Spinosad)

BIOHOP AudiENZ (W-6020-1, 480 g/l Spinosad)

Elvis (W-6020-2, 480 g/l Spinosad)

sono autorizzati temporaneamente fino al 31 ottobre 2026 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti.

Applicazioni autorizzate:

Ambito di applicazione	Effetto	Modalità di applicazione	Condizioni
Frutticoltura			
Nocciolo	<i>Balanino delle nocciuole</i>	Concentrazione: 0,02 % Dosaggio: 0,32 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: dopo la fioritura	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Condizioni d'uso

- 1 Al massimo 2 trattamenti per particella e anno.
- 2 Il dosaggio indicato si riferisce a un volume delle siepi di 10 000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle istruzioni del Servizio di omologazione.
- 3 SPe 3: per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 100 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 4 SPe 3: per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 4 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione.
- 5 SPe 3: per proteggere artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 100 m dai biotopi in virtù degli articoli 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.

¹ RS 916.161

- 6 SPe 3: per proteggere gli artropodi non bersaglio, mantenere una zona cuscinetto non trattata di 100 m rispetto alle superfici ricoperte di vegetazione che non sono utilizzate né a fini agricoli né orticoli. Questa distanza può essere ridotta se si adottano misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 7 SPe 8 – Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentino melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi). Le colture intercalari e le malerbe in fiore devono essere eliminate prima del trattamento (il giorno prima sfalciare/trinciare l'erba). Rispettare una fascia tampone non trattata di 20 metri da piante in fiore su particelle vicine. Tale distanza può essere ridotta se vengono applicate misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 8 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
- 9 Lavori successivi in colture trattate: indossare indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi).

Nota

A uso esclusivamente non professionale.

I prodotti fitosanitari

Bandsen (W-7133, 24 g/l Spinosad)

Perfetto (W-7133-2, 24 g/l Spinosad)

BIOHOP OriON (W-7133-3, 24 g/l Spinosad)

sono autorizzati temporaneamente fino al 31 ottobre 2026 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti.

Applicazioni autorizzate:

Ambito di applicazione	Effetto	Modalità di applicazione	Condizioni
Frutticoltura			
Nocciolo	<i>Balanino delle nocciuole</i>	Concentrazione: 0,4 % Dosaggio: 6,4 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: dopo la fioritura	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Condizioni d'uso

- 1 Al massimo 2 trattamenti per particella e anno.
- 2 Il dosaggio indicato si riferisce a un volume delle siepi di 10 000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle istruzioni del Servizio di omologazione.
- 3 SPe 3: per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 100 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 4 SPe 3: per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 4 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione.

- 5 SPe 3: per proteggere artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 100 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 6 SPe 3: per proteggere gli artropodi non bersaglio, mantenere una zona cuscinetto non trattata di 100 m rispetto alle superfici ricoperte di vegetazione che non sono utilizzate né a fini agricoli né orticoli. Questa distanza può essere ridotta se si adottano misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 7 SPe 8: pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi). Le colture intercalari e le malerbe in fiore devono essere eliminate prima del trattamento (il giorno prima sfalciare/trinciare l'erba). Rispettare una fascia tampone non trattata di 20 metri da piante in fiore su particelle vicine. Tale distanza può essere ridotta se vengono applicate misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 8 Durante la preparazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. Applicazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
- 9 Lavori successivi in colture trattate: indossare indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi).

Nota

A uso esclusivamente non professionale.

Revoca dell'effetto sospensivo

A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968² sulla procedura amministrativa.

Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; deve essere inoltrato in duplice copia e devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

26 gennaio 2026

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Il direttore, Laurent Monnerat

