



Foglio illustrativo n. 7377 / 2024

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica: Erbicida
Formulazione: SC sospensione concentrata
Tenore di principi attivi: 58.3 % Metamitron (700 g/l)
Denominazione IUPAC: 4-amino-4,5-dihydro-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5-one

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi: Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto: Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

MetaCare

Numero di omologazione federale: D-7412	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: 00A126-00/004	Titolare dell'autorizzazione estera: Agrocare Chemicals KFT, Ungheria

Metamitron 700 SC

Numero di omologazione federale: D-6203	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: 006470-00/017	Titolare dell'autorizzazione estera: Bernbeck LLP, Regno Unito

Devoid

Numero di omologazione federale: D-6882	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: 00A126-00	Titolare dell'autorizzazione estera: JT Agro Ltd, United Kingdom

Tornado SC

Numero di omologazione federale: F-2151	Paese di provenienza: Francia
Numero di omologazione estero: 9300322	Titolare dell'autorizzazione estera: Adama France SAS, Francia

Goltix 700 SC

Numero di omologazione federale: I-4051	Paese di provenienza: Italia
Numero di omologazione estero: 10569	Titolare dell'autorizzazione estera: ADAMA Italia srl, Italia

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Orticoltura			
Barbabietola	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 3 - 5 l/ha Applicazione: In post-emergenza.	1, 2, 3
Campicoltura			
Barbabietole da foraggio e da zucchero	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 3 - 5 l/ha Applicazione: In pre-emergenza e in post-emergenza.	2, 3

Oneri generali / agronomici:

- 1 La dose d'applicazione più bassa per i suoli sabbiosi e poveri di humus; La dose più elevata per i suoli pesanti e ricchi di humus.
- 3 Trattamtno frazionato (la dose indicata corrisponde al quantitativo totale autorizzato).

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 2 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

FraSI PF

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.