



Foglio illustrativo n. 8290 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Erbicida
Formulazione:	SL concentrato solubile in acqua
Tenore di principi attivi:	43.9 % MCPA (500 g/l)
Denominazione IUPAC:	(4-chloro-2-methylphenoxy)acetic acid

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Campicoltura			
Cereali	Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Applicazione: In primavera (BBCH 13 - 39).	1
Prati e pascoli	Specie di ranuncoli	Dosaggio: 3 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 2
Prati e pascoli	Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Dopo l'emergenza della semina.	1, 2, 3
Prati e pascoli	Cardi perenni, Specie di romice	Concentrazione: 0.75 % Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 2, 4
Coltivazione piante ornam.			
Tappeti erbosi e terreni sportivi	Dicotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Applicazione: Durante il periodo di vegetazione (maggio-agosto).	1, 5
Superfici non coltivate			
Terreno incolto	Stoppione	Concentrazione: 0.75 %	1, 4

Oneri generali / agronomici:

- 2 Pascolo o sfalcio (foraggio fresco o conservato) al più presto 3 settimane dopo il trattamento.
- 3 Trattamento su tutta la superficie dopo una nuova semina.

- 4 Trattamento pianta per pianta.
- 5 Al massimo 2 trattamenti per particella e per anno ad un intervallo di 28 giorni.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 1 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + occhiali di protezione o una visiera.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frase PF

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- Spe 1 Per proteggere gli organismi del suolo non applicare questo prodotto più di 4 volte per anno e particella.