



Foglio illustrativo n. 7730 / 2026

Per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 47 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF) del 20 agosto 2025 (RS 916.161)

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fungicida
Formulazione:	SC sospensione concentrata
Tenore di principi attivi:	17.70% Amisulbrom (200 g/l)
Denominazione IUPAC:	3-(3-bromo-6-fluoro-2-methylindol-1-ylsulfonyl)-N,N-dimethyl-1,2,4-triazole-1-sulfonamide

Stoccaggio

Il prodotto deve essere stoccato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici, in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate. I contenitori aperti che non sono stati consumati completamente devono essere richiusi.

Smaltimento

Contenitori:	Consegnare i contenitori vuoti al servizio di raccolta dei rifiuti.
Residui di prodotto:	Per lo smaltimento, portare i residui del prodotto al centro di raccolta comunale, al centro di raccolta per i rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Imballaggio ed etichettatura

Per l'immissione sul mercato in Svizzera il prodotto fitosanitario deve essere lasciato nell'imballaggio originale e l'etichetta apposta all'estero deve rimanere visibile sull'imballaggio (cfr. art. 69 cpv. 3 e art. 72 cpv. 3 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF).

Si applicano la classificazione e l'etichettatura dell'etichetta originale estera.

L'imballaggio deve inoltre recare le indicazioni di cui all'articolo 72 capoverso 1 lettere a–c. Le indicazioni sui possibili usi del prodotto fitosanitario e le condizioni connesse a tale uso sono quelle del prodotto di riferimento omologato in Svizzera (cfr. art. 47 cpv. 2). Le istruzioni allegate all'imballaggio rilasciate dal Servizio di omologazione possono essere utilizzate per l'etichettatura (cfr. art. 52 OPF). Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui prodotti chimici e sulla protezione dell'ambiente.

Prodotti commerciali

Amisu

Numero di omologazione federale: D-7466

Paese di provenienza: Germania

Numero di omologazione estero: 026282-00/008

Titolare dell'autorizzazione estera: Agrimotion Deutschland GmbH

Leimay

Numero di omologazione federale: F-6082

Paese di provenienza: Francia

Numero di omologazione estero: 2140179

Titolare dell'autorizzazione estera: Nissan Chemical Europe S.A.S.

Leimay

Numero di omologazione federale: I-6083

Paese di provenienza: Italia

Numero di omologazione estero: 014406

Titolare dell'autorizzazione estera: Scam SPA

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Campicoltura			
Patate	Peronospora della patata	Termine d'attesa: 2 Settimane. Applicazione: 1° trattamento in caso di rischio di infezione risp. su segnalazione del servizio d'allarme.	2,5,7,8,10
Tabacco	Peronospora del tabacco	Applicazione: 3 per coltura e anno.	2,5,7,8
Viticoltura			
Vite	Peronospora della vite	Concentrazione: 0,02%. Termine d'attesa: 4 Settimane. Applicazione: applicazione per via aerea, Dopo la fioritura, al più tardi entro metà agosto.	2,3,5,8,9,11
Vite	Peronospora della vite	Concentrazione: 0,02%. Termine d'attesa: 4 Settimane. Applicazione: Dopo la fioritura, al più tardi entro metà agosto.	2,3,4,5,8,9
Vite	Peronospora della vite	Concentrazione: 0,02%. Termine d'attesa: 4 Settimane. Applicazione: Trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro metà agosto.	1,2,3,4,5,8
Vite	Peronospora della vite	Concentrazione: 0,02%. Termine d'attesa: 4 Settimane. Applicazione: Trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro metà agosto, applicazione per via aerea.	2,3,5,6,8,11

Oneri

- 1 Soltanto in combinazione con 0.1% Folpet 80 WG o con 0.2% Stamina S o con 0.1% Alial o con 0.1% Alial 80 WG .
- 2 SPa 1: Per evitare l'insorgenza di resistenza utilizzare il prodotto in alternanza con prodotti che non contengono principi attivi del gruppo di FRAC numero 21 (Quinone inside Inhibitors, Qil).
- 3 La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m³/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.

- 4 SPe 3: per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
 - 5 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi.
 - 6 Soltanto in combinazione con 0.1% Folpet 80 WG o con 0.2% Stamina S.
 - 7 SPe 3: Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione.
 - 8 SPa 1: Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 3 trattamenti per coltura con prodotti del gruppo di principi attivi FRAC numero 21 (Quinone inside Inhibitors, Qil).
 - 9 Soltanto in combinazione con 0.125% Kocide 2000 o con 0.1% Oxycuivre 50.0.
 - 10 Termine di attesa di 1 settimana per le patate primaticce.
 - 11 SPe 3: Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una distanza minima pari a 60 m rispetto alle acque di superficie.
-

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frase PF

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.