



Foglio illustrativo n. 7203 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Insetticida
Formulazione:	SC sospensione concentrata
Tenore di principi attivi:	7.86 % Bifentrin (80 g/l)
Denominazione IUPAC:	2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Coltivazione di bacche			
Lampone	Verme del lampone	Concentrazione: 0.025 % Dosaggio: 0.25 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Prima e dopo la fioritura.	1, 2, 3, 4, 5, 6

Orticoltura

Aglio, Cipolle da tavola, Cipolle dolci, Scalogni	Afidi , Aleurodidi, Tignola del porro, Tripidi	Dosaggio: 0.25 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane	2, 4, 5, 7, 8
Alchechengio, Barbabietola, Carote, Cavoli / rape da taglio, Cavoli a infiorescenza, Cavoli a testa, Cavoli di Bruxelles, Cicoria belga, Cima di rapa, Crescione, Fagioli, Fave, Insalate (Asteracee), Insalate asiatiche (Brassicacee), Mais dolce, Melanzana, Pastinaca, Peperone, Pepino, Piselli senza baccello, Pomodori, Prezzemolo tuberoso, Rafano rusticano / Ramolaccio, Ramolaccio, Rapa di Brassica rapa e B. napus, Ravanello, Rucola, Scorzonera, Sedano rapa, Topinambur, Tuberina, Valerianella	Afidi , Aleurodidi, Tripidi	Concentrazione: 0.025 % Dosaggio: 0.25 l/ha Termine d'attesa: 3 Giorni	2, 4, 5, 7, 8

Baby-Leaf (Asteraceae)	Afidi , Aleurodidi, Tripidi	Concentrazione: 0.025 % Dosaggio: 0.25 l/ha Termine d'attesa: 3 Giorni	2, 4, 5, 7, 8
Baby-Leaf (Brassicaceae)	Afidi , Aleurodidi, Tripidi	Concentrazione: 0.025 % Dosaggio: 0.25 l/ha Termine d'attesa: 3 Giorni	2, 4, 5, 7, 8
Carote, Pastinaca, Prezzemolo tuberoso, Sedano rapa	Mosca della carota	Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 4 Settimane	2, 4, 5, 8, 9
Cavoli a infiorescenza, Cavoli a testa, Cavoli di Bruxelles	Altiche, Cavolaie, Nottue (defogliatrici), Punteruolo degli steli di cavoli, Punteruolo delle galle dei cavoli	Dosaggio: 0.3 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane	2, 4, 5, 7, 8
Piselli senza baccello	Sitone del pisello	Dosaggio: 0.15 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane	2, 5, 8, 10, 11
Campicoltura			
Barbabietola da foraggio, Barbabietola da zucchero	Altiche della barbabietola	Dosaggio: 0.2 l/ha Termine d'attesa: 4 Settimane	2, 5, 7, 8, 10
Cereali	Cloropo del grano	Dosaggio: 0.2 l/ha Termine d'attesa: 6 Settimane	2, 5, 7, 8, 10
Colza	Meligete della colza Efficacia parziale: Cecidomia delle siliquie delle crocifere	Dosaggio: 0.2 l/ha Termine d'attesa: 6 Settimane Applicazione: Fino allo stadio fine sviluppo dei bottoni fiorali. (BBCH 59).	2, 5, 8, 10, 12
Colza	Punteruolo degli steli della colza	Dosaggio: 0.2 l/ha Termine d'attesa: 6 Settimane Applicazione: Stadi 31-53 (BBCH).	2, 5, 8, 10, 12
Colza autunnale	Altica della colza	Dosaggio: 0.2 l/ha Applicazione: In autunno.	2, 5, 8, 10, 12
Patate	Dorifora della patata	Dosaggio: 0.2 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	2, 5, 7, 8, 10
Pisello proteico	Sitone del pisello	Dosaggio: 0.1 l/ha	2, 5, 8, 12, 13
Coltivazione piante ornam.			
Serra: Bosso (Buxus)	Piralide del bosso	Concentrazione: 0.025 %	2, 5, 11, 14, 15
Serra: Colture da fiore e piante verdi	Aleurodidi, Tripidi	Concentrazione: 0.04 %	2, 5, 15, 16
Serra: Colture da fiore e piante verdi	Larve defogliatrici, Nottue terricole o vermi grigi	Concentrazione: 0.025 %	2, 5, 15
Serra: Colture da fiore e piante verdi	Afidi	Concentrazione: 0.025 %	2, 5, 15, 16

Oneri generali / agronomici:

- Al massimo 2 trattamenti per anno e particella.
- Per i lamponi estivi la dose indicata si riferisce allo stadio "inizio fioritura fino a 50% dei fiori aperti", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha.
Per i lamponi autunnali la dose si riferisce ad una siepe di 150 - 170 cm d'altezza, trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha.
- SPe 3: per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 100 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.
- SPe 8: Pericoloso per le api - Non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata. Prima del trattamento eliminare colture intercalari o malerbe in fiore (sfalcio o pacciamatura). Non deve essere applicato quando nelle particelle vicine ci sono piante in fiore.
- Al massimo 2 trattamenti per coltura.
- SPe 8 - Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe) o può essere utilizzato soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. Non deve essere applicato quando nelle particelle vicine ci sono piante in fiore.
- Soltanto durante il volo e in caso di lieve attacco trattamenti a intervalli di 10 - 14 giorni.
- SPe 3: per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.
- Al massimo 1 trattamento per coltura e anno.
- Al massimo un 1 trattamento per coltura.
- SPe 3: per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.
- Solamente per piante in vaso e in container.
- SPe 8: Pericoloso per le api - Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori.
- Adeguate soltanto contro ceppi non resistenti.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto.

- 5 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frase PF

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
- SPe 8 Pericoloso per le api