



Foglio illustrativo n. 6500 / 2026

Per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 47 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF) del 20 agosto 2025 (RS 916.161)

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fungicida
Formulazione:	WG granulare idrodispersibile
Tenore di principi attivi:	50% Kresoxim-metile
Denominazione IUPAC:	methyl (E)-2-methoxyimino-[2-(o-tolylloxymethyl)phenyl]acetate; methyl (aE)-a-(methoxyimino)-2-[(2-methylphenoxy)methyl]benzeneacetate

Stoccaggio

Il prodotto deve essere stoccato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici, in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate. I contenitori aperti che non sono stati consumati completamente devono essere richiusi.

Smaltimento

Contenitori:	Consegnare i contenitori vuoti al servizio di raccolta dei rifiuti.
Residui di prodotto:	Per lo smaltimento, portare i residui del prodotto al centro di raccolta comunale, al centro di raccolta per i rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Imballaggio ed etichettatura

Per l'immissione sul mercato in Svizzera il prodotto fitosanitario deve essere lasciato nell'imballaggio originale e l'etichetta apposta all'estero deve rimanere visibile sull'imballaggio (cfr. art. 69 cpv. 3 e art. 72 cpv. 3 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF).

Si applicano la classificazione e l'etichettatura dell'etichetta originale estera.

L'imballaggio deve inoltre recare le indicazioni di cui all'articolo 72 capoverso 1 lettere a–c. Le indicazioni sui possibili usi del prodotto fitosanitario e le condizioni connesse a tale uso sono quelle del prodotto di riferimento omologato in Svizzera (cfr. art. 47 cpv. 2). Le istruzioni allegate all'imballaggio rilasciate dal Servizio di omologazione possono essere utilizzate per l'etichettatura (cfr. art. 52 OPF). Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui prodotti chimici e sulla protezione dell'ambiente.

Prodotti commerciali

Alliage

Numero di omologazione federale: F-3910

Numero di omologazione estero: 9600398

Paese di provenienza: Francia

Titolare dell'autorizzazione estera: BASF Agro SAS

Stroby DF

Numero di omologazione federale: F-3913

Numero di omologazione estero: 9700214

Paese di provenienza: Francia

Titolare dell'autorizzazione estera: BASF Agro SAS

Synthese +

Numero di omologazione federale: F-3914

Numero di omologazione estero: 2040050

Paese di provenienza: Francia

Titolare dell'autorizzazione estera: Phyto - Service

Quimera

Numero di omologazione federale: I-6875

Numero di omologazione estero: 15988

Paese di provenienza: Italia

Titolare dell'autorizzazione estera: Industrias Afrasa S.A

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Coltivazione di bacche			
Fragola	Oidio della fragola	Concentrazione: 0,03%. Dosaggio: 0,3 kg/ha. Termine d'attesa: 2 Settimane.	1,2,6
Specie di ribes	Oidio delle varietà di ribes	Concentrazione: 0,02%. Dosaggio: 0,2 kg/ha. Termine d'attesa: 3 Settimane.	5,6,14
Uva spina, Ribes nero, Ribes rosso	Antracnosi	Concentrazione: 0,02%. Dosaggio: 0,2 kg/ha. Termine d'attesa: 3 Settimane.	5,6,14
Coltivazione piante ornam.			
Crisantemo, Garofani	Ruggini su piante ornamentali	Concentrazione: 0,03%.	6,11,13
Rose	Ticchiolatura della rosa; Oidio delle rose	Concentrazione: 0,03%.	1,6,13
Frutticoltura			
Frutta a granelli	Ticchiolatura della frutta a granelli; Oidio della mela/pera	Concentrazione: 0,01%. Dosaggio: 0,2 kg/ha. Applicazione: Al più tardi entro fine luglio.	3,6,10,13,15

Orticoltura

Asparagi	Botrytis spp.; Ruggine dell'asparago; Bruciatura delle foglie dell'asparago	Dosaggio: 0,5 kg/ha. Applicazione: Soltanto dopo il raccolto.	5,6
Cucurbitacee	Oidio delle Cucurbitacee	Dosaggio: 0,3 kg/ha. Termine d'attesa: 3 Giorni.	6,9
Pomodori	Oidio delle solanceae	Concentrazione: 0,05%. Termine d'attesa: 3 Giorni.	6,11,13

Viticoltura

Vite	Rossore parassitario; Peronospora della vite; Marciume nero	Concentrazione: 0,02%. Dosaggio: 0,24 kg/ha. Applicazione: Dallo stadio di 3 foglie, al più tardi entro metà agosto.	4,6,7,8,12,13
------	---	--	---------------

Oneri

- 1 SPa 1: Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 3 trattamenti per anno e coltura con prodotti del gruppo di principi attivi FRAC C3 (tra cui strobilurine).
- 2 La dose indicata si riferisce allo stadio "piena fioritura fino all'inizio dell'arrossamento dei frutticini", 4 piante/m², trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.
- 3 Soltanto in combinazione con Captan 80 WDG (0.1%, 1.6 kg/ha) o Delan WG (0.03%, 480 g/ha).
- 4 La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m³/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.
- 5 SPa 1: Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 3 trattamenti per anno e particella con prodotti del gruppo di principi attivi FRAC C3 (tra cui strobilurine).
- 6 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi.
- 7 Anche per applicazione per via aerea.
- 8 Soltanto in combinazione con 0.125% Folpet 80 (2 kg/ha).
- 9 SPa 1: Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 2 trattamenti per coltura con prodotti del gruppo di principi attivi FRAC C3 (tra cui strobilurine).
- 10 La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.
- 11 SPa 1: Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 3 trattamenti per coltura con prodotti del gruppo di principi attivi FRAC C3 (tra cui strobilurine).
- 12 SPa 1: Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 3 trattamenti per anno e particella con prodotti del gruppo di principi attivi FRAC C3 (tra cui strobilurine), di cui al massimo 2 irrorazioni aeree.
- 13 SPe 3: per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 14 La dose indicata si riferisce allo stadio "allegagione (50 - 90% delle infiorescenze hanno frutti visibili)", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.
- 15 SPa 1: Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 4 trattamenti per anno e particella con prodotti del gruppo di principi attivi FRAC C3 (tra cui strobilurine), di cui al massimo 2 trattamenti consecutivi.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio: Fasi PF

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.