



Foglio illustrativo n. 8170 / 2026

Per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 47 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF) del 20 agosto 2025 (RS 916.161)

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fungicida
Formulazione:	WG granulare idrodispersibile
Tenore di principi attivi:	50% fenpyrazamine
Denominazione IUPAC:	S-allyl 5-amino-2,3-dihydro-2-isopropyl-3-oxo-4-(o-tolyl)pyrazole-1-carbothioate

Stoccaggio

Il prodotto deve essere stoccato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici, in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate. I contenitori aperti che non sono stati consumati completamente devono essere richiusi.

Smaltimento

Contenitori:	Consegnare i contenitori vuoti al servizio di raccolta dei rifiuti.
Residui di prodotto:	Per lo smaltimento, portare i residui del prodotto al centro di raccolta comunale, al centro di raccolta per i rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Imballaggio ed etichettatura

Per l'immissione sul mercato in Svizzera il prodotto fitosanitario deve essere lasciato nell'imballaggio originale e l'etichetta apposta all'estero deve rimanere visibile sull'imballaggio (cfr. art. 69 cpv. 3 e art. 72 cpv. 3 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF).

Si applicano la classificazione e l'etichettatura dell'etichetta originale estera.

L'imballaggio deve inoltre recare le indicazioni di cui all'articolo 72 capoverso 1 lettere a–c. Le indicazioni sui possibili usi del prodotto fitosanitario e le condizioni connesse a tale uso sono quelle del prodotto di riferimento omologato in Svizzera (cfr. art. 47 cpv. 2). Le istruzioni allegate all'imballaggio rilasciate dal Servizio di omologazione possono essere utilizzate per l'etichettatura (cfr. art. 52 OPF). Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui prodotti chimici e sulla protezione dell'ambiente.

Prodotti commerciali

Prolectus 50 WG

Numero di omologazione federale: D-6257

Paese di provenienza: Germania

Numero di omologazione estero: 007679-00/004

Titolare dell'autorizzazione estera: OGET Innovations GmbH

Fenpyrazamine 500

Numero di omologazione federale: D-6828

Paese di provenienza: Germania

Numero di omologazione estero: 007679-00/005

Titolare dell'autorizzazione estera: Bernbeck LLP

Prolectus

Numero di omologazione federale: D-7081

Paese di provenienza: Germania

Numero di omologazione estero: 007679-00

Titolare dell'autorizzazione estera: Sumitomo Chemical Agro Europe SAS

Fenpyraz

Numero di omologazione federale: D-7082

Paese di provenienza: Germania

Numero di omologazione estero: 007679-00/006

Titolare dell'autorizzazione estera: Agrimotion S. A.

Prolectus

Numero di omologazione federale: D-7181

Paese di provenienza: Germania

Numero di omologazione estero: 007679-00/007

Titolare dell'autorizzazione estera: STAR Agro Handels GmbH

Prolectus 50 WG

Numero di omologazione federale: I-6106

Paese di provenienza: Italia

Numero di omologazione estero: 015549

Titolare dell'autorizzazione estera: Sumitomo Chemical Agro Europe SAS

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
----------------------	---------------------------	------------------------------	-----

Coltivazione di bacche

Fragola	Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Concentrazione: 0,12%. Dosaggio: 1,2 kg/ha. Termine d'attesa: 1 Giorni.	1,2
---------	------------------------------------	---	-----

Coltivazione piante ornam.

Colture da fiore e piante verdi	Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Concentrazione: 0,1%.	2,3
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------	-----

Frutticoltura

Albicocco	Monilia dei frutti	Concentrazione: 0,08%. Dosaggio: 1,2 kg/ha. Termine d'attesa: 3 Settimane. Applicazione: Trattamento a inizio e a fine fioritura, nonché prima della raccolta.	4,6,7,8,12
Frutta a nocciolo	Monilia dei rami e dei fiori; Monilia dei frutti	Concentrazione: 0,08%. Dosaggio: 1,2 kg/ha. Termine d'attesa: 3 Settimane. Applicazione: Trattamento a inizio e a fine fioritura, nonché prima della raccolta.	6,8,9,12

Orticoltura

Serra: Pomodori, Peperone, Zucche con buccia commestibile, Melanzana, Cetrioli	Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Concentrazione: 0,1%. Termine d'attesa: 3 Giorni.	5
--	---------------------------------------	--	---

Viticoltura

Vite	Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Dosaggio: 1,2 kg/ha. Applicazione: Ultimo trattamento all'invasatura, ma al più tardi a metà agosto.	10,11,13
------	---------------------------------------	---	----------

Oneri

- 1 La dose indicata si riferisce allo stadio "piena fioritura fino all'inizio dell'arrossamento dei frutticini", 4 piante/m², trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.
- 2 SPa 1: Per evitare l'insorgere di resistenza non applicare prodotti dello stesso gruppo di principi attivi per più di 2 volte per coltura.
- 3 Solamente per piante in vaso e in container.
- 4 Spe 3: Per proteggere gli organismi acquatici si deve rispettare una distanza minima pari a 20 m senza trattamento rispetto alle acque di superficie.
- 5 SPa 1: Per evitare l'insorgere di resistenza non applicare prodotti dello stesso gruppo di principi attivi per più di 3 volte per coltura.
- 6 SPa 1: Per evitare l'insorgere di resistenza non applicare prodotti dello stesso gruppo di principi attivi per più di 3 volte per anno e particella.
- 7 Applicazione per via aerea.
- 8 La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.
- 9 SPe 3: per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 10 SPa 1: Per evitare l'insorgere di resistenza non applicare prodotti dello stesso gruppo di principi attivi per più di 1 volta per anno e particella.
- 11 Non trattare su uva da tavola.
- 12 Il termine di attesa per le colture fruttifere senza copertura contro la pioggia è di 10 giorni.
- 13 La dose indicata si riferisce ad un trattamento nella zona dei grappoli con una quantità standard di poltiglia di 1200 l/ha (base per il calcolo).

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frasi PF

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.