



Foglio illustrativo n. 7247 / 2024

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica: Erbicida
Formulazione: EC concentrato emulsionato
Tenore di principi attivi: 13.4 % Fluazifop-P-butile (125 g/l)
Denominazione IUPAC: butyl-(R)-2-[4-(5-trifluormethyl-2-pyridyloxy)phenoxy]propionat

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi: Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto: Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Trade 125

Numero di omologazione federale: I-3252	Paese di provenienza: Italia
Numero di omologazione estero: 11988	Titolare dell'autorizzazione estera: Sharda Cropchem Espana S.L., Spagna

Fusilade Max

Numero di omologazione federale: F-3900	Paese di provenienza: Francia
Numero di omologazione estero: 2000044	Titolare dell'autorizzazione estera: Nufarm SAS, Francia

Fusilade Max

Numero di omologazione federale: I-2788	Paese di provenienza: Italia
Numero di omologazione estero: 11353	Titolare dell'autorizzazione estera: Nufarm Italia S.R.L., Italia

Fusilade Max

Numero di omologazione federale: D-7001	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: 024847-00	Titolare dell'autorizzazione estera: Nufarm Deutschland GmbH, Germania

Ruitor

Numero di omologazione federale: I-2694	Paese di provenienza: Italia
Numero di omologazione estero: 11841	Titolare dell'autorizzazione estera: Sharda Cropchem Ltd., India

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Coltivazione di bacche			
Fragola	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 2 l/ha Termine d'attesa: 6 Settimane Applicazione: Prima della fioritura e dopo il raccolto.	1, 2
Fragola	Monocotiledoni annuali (malerbe), Ricacci di cereali	Dosaggio: 1 - 1.5 l/ha Termine d'attesa: 6 Settimane Applicazione: Prima della fioritura e dopo il raccolto.	1, 2
Specie di ribes	Monocotiledoni annuali (malerbe), Ricacci di cereali	Dosaggio: 1 - 1.5 l/ha	1, 3
Specie di ribes	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha	1, 3
Specie di rubus	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha	1, 3
Specie di rubus	Monocotiledoni annuali (malerbe), Ricacci di cereali	Dosaggio: 1 - 1.5 l/ha	1, 3
Frutticoltura			
Frutta a granelli, Frutta a nocciolo	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Termine d'attesa: 4 Settimane	1, 3
Frutta a granelli, Frutta a nocciolo	Monocotiledoni annuali (malerbe), Ricacci di cereali	Dosaggio: 1 - 1.5 l/ha Termine d'attesa: 4 Settimane	1, 3
Viticoltura			
Vite	Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 1 - 1.5 l/ha	1, 3
Vite	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 2 l/ha	1, 3
Orticoltura			
Asparagi	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Applicazione: Dopo il raccolto.	1, 3
Asparagi	Monocotiledoni annuali (malerbe), Ricacci di cereali	Dosaggio: 1 - 1.5 l/ha Applicazione: Dopo il raccolto.	1, 3
Baby-Leaf (Chenopodiaceae)	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Termine d'attesa: 4 Settimane	1, 4, 5
Baby-Leaf (Chenopodiaceae)	Monocotiledoni annuali (malerbe), Ricacci di cereali	Dosaggio: 1 - 1.5 l/ha Termine d'attesa: 4 Settimane	1, 4, 5
Barbabietola, Cipolle, Porro, Scorzonera, Sedano rapa	Monocotiledoni annuali (malerbe), Ricacci di cereali	Dosaggio: 1 - 1.5 l/ha Termine d'attesa: 8 Settimane	1, 4
Barbabietola, Cipolle, Porro, Scorzonera, Sedano rapa	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Termine d'attesa: 8 Settimane	1, 4
Bietola da taglio, Prezzemolo	Monocotiledoni annuali (malerbe), Ricacci di cereali	Dosaggio: 1 - 1.5 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: In post-emergenza, Stadio di 2-3 foglie delle graminacee infestanti.	1, 4, 6
Bietola da taglio, Prezzemolo	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Stadio di 3-4 foglie delle graminacee infestanti, In post-emergenza.	1, 4, 6
Broccoli, Cavolfiore	Monocotiledoni annuali (malerbe), Ricacci di cereali	Dosaggio: 1 - 1.5 l/ha Termine d'attesa: 6 Settimane	1, 4
Cardo	Monocotiledoni annuali (malerbe), Ricacci di cereali	Dosaggio: 1 - 1.5 l/ha Termine d'attesa: 6 Settimane Applicazione: In post-emergenza, Stadio di 2-3 foglie delle graminacee infestanti.	1, 4, 6
Carote, Finocchio dolce, Spinaci	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Termine d'attesa: 4 Settimane	1, 4
Carote, Finocchio dolce, Spinaci	Monocotiledoni annuali (malerbe), Ricacci di cereali	Dosaggio: 1 - 1.5 l/ha Termine d'attesa: 4 Settimane	1, 4
Cavoli a testa, Cavolo rapa	Monocotiledoni annuali (malerbe), Ricacci di cereali	Dosaggio: 1 - 1.5 l/ha Termine d'attesa: 8 Settimane	1, 4
Fagioli con baccello	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Termine d'attesa: 4 Settimane	1, 4, 7
Fagioli con baccello	Monocotiledoni annuali (malerbe), Ricacci di cereali	Dosaggio: 1 - 1.5 l/ha Termine d'attesa: 4 Settimane	1, 4, 7
Indivia	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Termine d'attesa: 6 Settimane Applicazione: In post-emergenza o dopo la piantagione, Al più tardi fino all'inizio della formazione delle teste.	1, 4, 6
Indivia e cicoria da foglia, Insalate del genere Lactuca	Monocotiledoni annuali (malerbe), Ricacci di cereali	Dosaggio: 1 - 1.5 l/ha Termine d'attesa: 6 Settimane Applicazione: In post-emergenza o dopo la piantagione, Al più tardi fino all'inizio della formazione delle teste.	1, 4, 6

Pieno campo: Rucola	Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 6 Settimane Applicazione: Stadio BBCH 12-21 delle graminacee infestanti., In post-emergenza.	1, 4, 5, 6
Piselli	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Termine d'attesa: 8 Settimane	1, 4, 7
Piselli	Monocotiledoni annuali (malerbe)., Ricacci di cereali	Dosaggio: 1 - 1.5 l/ha Termine d'attesa: 8 Settimane	1, 4, 7
Rafano rusticana / Ramolaccio	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Termine d'attesa: 8 Settimane Applicazione: In post-emergenza., Stadio di 3-4 foglie delle graminacee infestanti.	1, 4, 6
Rafano rusticana / Ramolaccio	Monocotiledoni annuali (malerbe)., Ricacci di cereali	Dosaggio: 1 - 1.5 l/ha Termine d'attesa: 8 Settimane Applicazione: Stadio di 2-3 foglie delle graminacee infestanti., In post-emergenza.	1, 4, 6
Ramolaccio, Ravanello	Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 28 Giorni Applicazione: Stadio BBCH 12-21 delle graminacee infestanti., In post-emergenza.	1, 4, 6
Sedano da coste	Monocotiledoni annuali (malerbe)., Ricacci di cereali	Dosaggio: 1.5 l/ha Termine d'attesa: 7 Settimane	1, 4, 6, 8
Serra: Pomodori	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Termine d'attesa: 8 Settimane	1, 4
Serra: Pomodori	Monocotiledoni annuali (malerbe)., Ricacci di cereali	Dosaggio: 1 - 1.5 l/ha Termine d'attesa: 8 Settimane	1, 4
Campicoltura			
Barbabietola da foraggio, Barbabietola da zucchero, Colza, Fava	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Termine d'attesa: 8 Settimane	1, 4
Barbabietola da foraggio, Barbabietola da zucchero, Colza, Fava	Monocotiledoni annuali (malerbe)., Ricacci di cereali	Dosaggio: 1 - 1.5 l/ha Termine d'attesa: 8 Settimane	1, 4
Girasole, Soia	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Termine d'attesa: 90 Giorni	1, 4
Girasole, Soia	Monocotiledoni annuali (malerbe)., Ricacci di cereali	Dosaggio: 1 - 1.5 l/ha Termine d'attesa: 90 Giorni	1, 4
Luppolo	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha	1, 3
Luppolo	Monocotiledoni annuali (malerbe)., Ricacci di cereali	Dosaggio: 1 - 1.5 l/ha	1, 3
Patate	Monocotiledoni annuali (malerbe)., Ricacci di cereali	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 90 Giorni Applicazione: Prima della chiusura dei cespi.	1, 4
Patate	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 2 l/ha Termine d'attesa: 90 Giorni Applicazione: Prima della chiusura dei cespi.	1, 4
Pisello proteico	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Termine d'attesa: 6 Settimane	1, 4
Pisello proteico	Monocotiledoni annuali (malerbe)., Ricacci di cereali	Dosaggio: 1 - 1.5 l/ha Termine d'attesa: 6 Settimane	1, 4
Tabacco	Monocotiledoni annuali (malerbe)., Ricacci di cereali	Dosaggio: 1 - 1.5 l/ha	1, 4
Tabacco	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha	1, 4
Coltivazione piante ornam.			
Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), Colture da fiore e piante verdi, Rose	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha	1, 2, 9
Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), Colture da fiore e piante verdi, Rose	Monocotiledoni annuali (malerbe)., Ricacci di cereali	Dosaggio: 1 - 1.5 l/ha	1, 2, 9
Selvicoltura			
Vivai forestali	Monocotiledoni annuali (malerbe)., Ricacci di cereali	Dosaggio: 1 - 1.5 l/ha	1, 3, 9
Vivai forestali	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha	1, 3, 9
Superfici per la promozione della biodiversità (SPB) secondo OPD			
Superficie coltiva aperta	Gramigna	Concentrazione: 1 %	1, 10, 11

Oneri generali / agronomici:

2 Al massimo 1 trattamento per coltura e anno.

- 3 Al massimo 1 trattamento per anno e particella.
- 4 Al massimo un 1 trattamento per coltura.
- 5 In colture o varietà sensibili può provocare danni legati ad un'eventuale fitotossicità: effettuare un trattamento di prova prima del trattamento generale.
- 6 Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).
- 7 Non utilizzare nella produzione di colture, che saranno seccati dopo la raccolta.
- 9 Tener presente la sensibilità delle colture conformemente alle indicazioni del titolare dell'autorizzazione.
- 10 Per il trattamento pianta per pianta secondo l'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD).
- 11 Trattamento con vaporizzatore a zaino.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 1 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi.
- 8 In caso di applicazione nelle serre, queste vanno areate a lungo prima di riaccedervi.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frase PF

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.