Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Settore Protezione sostenibile dei vegetali

Foglio illustrativo n. 7657 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Erbicida
Formulazione:	OD olio dispersibile
Tenore di principi attivi:	6.25 % Nicosulfuron (60 g/l)
Denominazione IUPAC:	2-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-N,N-dimethylnicotinamide

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Fornet Extra 6 OD

Numero di omologazione federale: I-6453
Paese di provenienza: Italia
Numero di omologazione estero: 12684
Titolare dell'autorizzazione estera: ISK Biosciences Europe N.V.,Belgio

Nisshin Extra 6 OD

Numero di omologazione federale: I-6467
Paese di provenienza: Italia
Numero di omologazione estero: 15310
Titolare dell'autorizzazione estera: ISK Biosciences Europe N.V.,Belgio

Samson Extra 6 Od

Numero di omologazione federale: I-6466
Paese di provenienza: Italia
Numero di omologazione estero: 15107
Titolare dell'autorizzazione estera: ISK Biosciences Europe N.V.,Belgio

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Campicoltura			
Mais	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe). Efficacia parziale: Gramigna	Dosaggio: 0.75 l/ha Applicazione: In post-emergenza precoce; stadio di 2 - 4, massimo di 6 foglie.	1, 2, 3, 4, 5, 6

Ufficio federale dell'agricoltura, 3003 Berna
tel. +41 58 462 85 16, fax +41 58 462 70 80
psm@blw.admin.ch
www.blw.admin.ch

Oneri generali / agronomichi:

2 Spe 1 - Per proteggere le acque sotterranee, non applicare piú di 60 g per ha del principio attivo Nicosulfuron sulla stessa particella durante un periodo di 2 anni.

3 SPa 1: Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 1 trattamento per anno e particella con prodotti dello stesso gruppo di principi attivi.

4 SPe 3: per proteggere le piante non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.

5 SPe 3: per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.

6 In colture o varietà sensibili può provocare danni legati ad un'eventuale fitotossicità.

Oneri per la protezzione dell'utilizzatore:

1 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frasi PF

	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
SP 1	Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
SPe 2	Onde proteggere le acque sotterranee evitare i trattamenti nelle zone di protezione delle acque sotterranee (S2 e Sh).