Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

**Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV**
Servizio di omologazione per i prodotti fitosanitari

# Foglio illustrativo n. 7725 / 2025

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

## Proprietà del prodotto

| | |
|---|---|
| Denominazione specifica: | Erbicida |
| Formulazione: | WG granulare idrodispersibile |
| Tenore di principi attivi: | 12.5 % Amidosulfuron ; 1.25 % Iodosulfuron-metile-sodio ; Safener: 12.5 % Mefenpir-dietile |
| Denominazione IUPAC: | 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-mesyl(methyl)sulfamoylurea; methyl 4-iodo-2-[3-(4-methoxy-6-methyl-1,2,5-triazin-2-yl)ureidosulfonyl]benzoate, sodium salt; diethyl (RS)-1-(2,4-dichlororphenyl)-5-methyl-2-pyrazoline-3,5-dicarboxylate |

## Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

## Smaltimento

| | |
|---|---|
| Imballaggi: | Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia. |
| Residui di prodotto: | Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita. |

## Prodotti commerciali

### Hoestar Super

Numero di omologazione federale: D-5296

Paese di provenienza: Germania

Numero di omologazione estero: 024778-00

Titolare dell'autorizzazione estera: Bayer CropScience ,Germania

## Indicazioni autorizzate

| Campo d'applicazione | Agente patogeno/Efficacia | Applicazione nel rispetto di | (*) |
|---|---|---|---|
| **Campicoltura** | | | |
| Farro, Frumento, Orzo, Spelta, Triticale | Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe) | Dosaggio: 0.15 - 0.2 kg/ha<br>Applicazione: Stadi 13 - 32 (BBCH). | 1, 2 |
| Lino | Dicotiledoni annuali (malerbe) | Dosaggio: 0.2 kg/ha<br>Termine d'attesa: 90 Giorni | 1, 2, 3, 4 |
| Segale | Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe) | Dosaggio: 0.15 - 0.2 kg/ha<br>Applicazione: Stadi 13 - 32 (BBCH). | 1, 2, 5 |

### Oneri generali / agronomici:

2 SPe 3: per proteggere le piante non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.

3 Al massimo 1 trattamento per anno e particella.

4 Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).

5 Trattamento in colture seminate in autunno.

### Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

1 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + occhiali di protezione o una visiera.

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna
tel. +41 58 462 85 16
psm@blv.admin.ch
www.blv.admin.ch

**Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:**
**Frasi PF**

| | |
|---|---|
| | Tenere fuori dalla portata dei bambini. |
| SP 1 | Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio. |