



Foglio illustrativo n. 7775 / 2021

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Erbicida
Formulazione:	ME microemulsione
Tenore di principi attivi:	9.8 % Fluroxypyr (100 g/l) [pari a Fluroxypyr-meptil (145 g/L, 14.2%)]; 2.96 % aminopyralid (30.1 g/l)
Denominazione IUPAC:	4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacetic acid; 4-amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid or 4-amino-3,6-dichloropicolinic acid

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Aminopyralid + Fluroxypyr

Numero di omologazione federale: D-6335	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: GP 025702-00/011	Titolare dell'autorizzazione estera: Bernbeck LLP, Regno Unito

Simplex

Numero di omologazione federale: D-6521	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: 025702-00	Titolare dell'autorizzazione estera: Corteva Agriscience Germany GmbH, Germania

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Campicoltura			
Prati e pascoli	Cardi perenni, Poligono del Giappone, Rovi, Senecioni tossici (Senecio spp.)	Concentrazione: 1 % Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Con vaporizzatore a zaino.	1, 2, 3, 4, 5
Prati e pascoli	Specie di romice	Concentrazione: 2.5 % Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Con vaporizzatori manuali.	1, 2, 3, 4, 5
Prati e pascoli	Ortica dioica, Specie di romice	Concentrazione: 0.5 % Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Con vaporizzatore a zaino.	1, 2, 3, 4, 5

Superfici non coltivate

Lungo le strade nazionali e cantonali (conformemente ORRPChim) , Scarpate e strisce verdi lungo le vie di comunicazione (conformemente ORRPChim)	Ambrosia , Cardi perenni, Poligono del Giappone, Rovi, Senecioni tossici (Senecio spp.)	Concentrazione: 1 %	1, 3, 4, 6
Lungo le strade nazionali e cantonali (conformemente ORRPChim) , Scarpate e strisce verdi lungo le vie di comunicazione (conformemente ORRPChim)	Ortica dioica, Romice comune	Concentrazione: 0.5 %	1, 3, 4, 6

Superfici per la promozione della biodiversità (SPB) secondo OPD

Superficie coltiva aperta	Specie di romice	Concentrazione: 0.5 %	1, 3, 4, 7
Superficie coltiva aperta	Poligono del Giappone	Concentrazione: 1 %	1, 4, 7, 8
Superficie coltiva aperta	Cardi perenni, Senecioni tossici (Senecio spp.)	Concentrazione: 1 %	1, 3, 4, 7
Superficie inerbita	Specie di romice	Concentrazione: 0.5 % Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 3, 4, 5, 7
Superficie inerbita	Poligono del Giappone	Concentrazione: 1 % Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 4, 5, 7, 8
Superficie inerbita	Cardi perenni, Rovi, Senecioni tossici (Senecio spp.)	Concentrazione: 1 % Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 3, 4, 5, 7

Oneri generali / agronomici:

- 2 Trattamento pianta per pianta.
- 3 Trattamento solo in primavera o in estate entro fine agosto.
- 4 SPe 1 - Per proteggere le acque sotterranee non applicare questo prodotto o altri prodotti contenenti Aminopyralid più di 1 volta ogni 2 anni sulla stessa particella
- 5 Pascolo o sfalcio (foraggio fresco o conservato) al più presto 3 settimane dopo il trattamento.
- 6 Conformemente all'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim): Soltanto trattamenti pianta per pianta su piante problematiche, che non possono essere combattute efficacemente con altre misure.
- 7 Per il trattamento pianta per pianta secondo l'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD).
- 8 Trattamento in estate, dopo un primo taglio, sui ricacci (1 m circa d'altezza) preferibilmente con un vaporizzatore.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 1 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: Indossare occhiali di protezione o una visiera.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frasi PF

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
- SPe 2 Onde proteggere le acque sotterranee evitare i trattamenti nelle zone di protezione delle acque sotterranee (S2 e Sh).