Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Servizio di omologazione per i prodotti fitosanitari

Foglio illustrativo n. 7684 / 2022

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fitoregolatore
Formulazione:	SC sospensione concentrata
Tenore di principi attivi:	26.5 % mepiquat cloruro (300 g/l); 4.4 % Calcio-proesadione (50 g/l)
Denominazione IUPAC:	1,1-dimethylpiperidinium chloride; calcium 3-oxido-5-oxo-4-propionylcyclohex-3-enecarboxylate

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Campicoltura			
Colza	Aumento della stabilità	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Autunno BBCH 13-20 e primavera BBCH 21-59	1
Colza	Aumento della stabilità	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Primavera., Stadi 21-59 (BBCH).	2
Colza	Aumento della stabilità	Dosaggio: 0.5 l/ha Applicazione: Stadi 13-20 (BBCH)., Autunno.	1, 3
Colza	Aumento della stabilità	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Autunno., Stadi 13-20 (BBCH).	2
Frumento, Orzo, Segale, Triticale	Aumento della stabilità	Dosaggio: 0.75 - 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 31-39 (BBCH).	4, 5, 6
Spelta	Aumento della stabilità	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Stadi 31-39 (BBCH).	5, 6, 7

Oneri generali / agronomici:

1 Al massimo 2 trattamenti in questa applicazione.

2 Al massimo 1 trattamento in questa applicazione.

3 Trattamenti a intervalli di almeno 14 giorni.

4 Trattamento in colture seminate in autunno.

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna
tel. +41 58 462 85 16
psm@blv.admin.ch
www.blv.admin.ch

5 Al massimo un 1 trattamento per coltura.

6 Pulire accuratamente il contenitore vuoto e smaltire con la spazzatura.

7 Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:
Frasi PF

	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
SP 1	Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.