



Foglio illustrativo n. 7809 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fungicida
Formulazione:	WG granulare idrodispersibile
Tenore di principi attivi:	65 % Mancozeb ; 4 % Benalaxil-M
Denominazione IUPAC:	manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt; methyl N-phenylacetyl-N-2,6-xylyl-D-alaninate

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Campicoltura			
Patate	Alternariosi delle solanacee, Peronospora della patata	Dosaggio: 2.5 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Oneri generali / agronomici:

- 1 SPA 1: Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 3 trattamenti per coltura con prodotti del gruppo di principi attivi FRAC numero 4 (PhenylAmides, PA).
- 3 Al massimo 14 giorni di intervallo fra serie di trattamenti.
- 4 Impiegare esclusivamente con un serbatoio per la poltiglia con miscelatore in funzione.
- 5 Termine di attesa di 2 settimane per le patate primaticce.
- 6 SPe 3: per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.
- 7 Non applicare su patate da semina né su colture protette di patate (fogli di plastica).
- 8 1° trattamento in caso di rischio di infezione risp. su segnalazione del servizio d'allarme.
- 9 Applicazione soltanto entro fine luglio al più tardi.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 2 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una visiera + un copricapo. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frase PF

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.