



Foglio illustrativo n. 6975 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fungicida
Formulazione:	WG granulare idrodispersibile
Tenore di principi attivi:	66.7 % Mancozeb ; 8.3 % Zoxamid
Denominazione IUPAC:	manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt; 3,5-Dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methyl-2-oxopropyl)-4-methylbenzamide

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Electis MZ

Numero di omologazione federale: D-5246	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: PI 024957-00/006	Titolare dell'autorizzazione estera: Star Agro Analyse und Handels GmbH, Austria

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Viticultura			
Vite	Peronospora della vite	Concentrazione: 0.18 % Dosaggio: 2.15 kg/ha Applicazione: Dallo stadio G alla fioritura.	1, 2, 3
Campicoltura			
Patate	Alternariosi delle solanacee, Peronospora della patata	Dosaggio: 1.8 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 4, 5, 6, 7

Oneri generali / agronomici:

- La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 61-69 (I), trattamento con una quantità-riferenza di poltiglia di 1'200 l/ha (base per il calcolo).
- SPa 1: Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti Zoxamid più di tre volte per anno e particella.
- Termine di attesa di 2 settimane per le patate primaticce.
- Al massimo 3 trattamenti per coltura.
- 1° trattamento in caso di rischio di infezione risp. su segnalazione del servizio d'allarme.

7 Trattamenti ad un intervallo di 7 - 10 giorni.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

1 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frase PF

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.