



Foglio illustrativo n. 6520 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fungicida
Formulazione:	SC sospensione concentrata
Tenore di principi attivi:	41.2 % Mepanipirim (440 g/l)
Denominazione IUPAC:	N-(4-methyl-6-prop-1-ynylpyrimidin-2-yl)aniline

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Coltivazione di bacche			
Fragola	Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane	1, 2, 3, 4, 5, 6
Lampone, Mora	Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane	1, 4, 5, 6, 7, 8
Frutticoltura			
Frutta a granelli	Marciume (Botrytis cinerea), Monilia dei rami e dei fiori, Ticchiolatura della frutta a granelli	Concentrazione: 0.03 % Dosaggio: 0.48 l/ha Applicazione: Durante la fioritura.	7, 9, 10, 11
Frutta a granelli	Ticchiolatura della frutta a granelli	Concentrazione: 0.02 % Dosaggio: 0.32 l/ha Applicazione: Dallo stadio BBCH 56 (bottoni fiorali visibili) fino a sfioritura.	7, 9, 10, 11
Viticultura			
Vite	Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 1.2 l/ha	4, 5, 7, 12
Orticoltura			
Aglione, Cipolle, Scalogni	Botrite della cipolla (Botrytis squamosa), Marciume del colletto di cipolla	Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane	3, 4, 5, 6

Fagioli con baccello	Botrytis spp., Mal dello sclerozio	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane Applicazione: Prima dell'inizio della fioritura., 1 - 2 trattamenti.	3, 4, 6
Coltivazione piante ornam.			
Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), Rose	Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Concentrazione: 0.1 % Applicazione: A titolo preventivo.	4, 5, 6, 7
Culture da fiore e piante verdi	Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Concentrazione: 0.1 % Applicazione: A titolo preventivo.	3, 4, 5, 6

Oneri generali / agronomici:

- 1 La concentrazione indicata si riferisce a una quantità d'acqua di base di 1000 l/ha.
- 2 La dose indicata si riferisce allo stadio dalla piena fioritura all'inizio dell'arrossamento dei frutticini, 4 piante/m².
- 5 Al massimo 1 trattamento per anno e particella.
- 8 Per i lamponi estivi e le more la dose per trattamento indicata si riferisce allo stadio dall'inizio della fioritura alla piena fioritura, volume delle siepi 10'000 m³/ha. Per i lamponi autunnali la dose per trattamento si riferisce allo stadio di inizio germogliamento delle gemme dormienti a inizio fioritura, volume delle siepi 7'500 m³/ha.
- 9 Al massimo 3 trattamenti per anno e particella con prodotti dello stesso gruppo di principi attivi.
- 10 La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha.
- 11 Soltanto in combinazione con Captan-S WG (0.1%, 1.6 kg/ha) o Delan WG (0.03%, 480 g/ha).
- 12 Ultimo trattamento all'invaiaura, ma al più tardi a metà agosto.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 3 Durante la preparazione della poltiglia è necessario indossare guanti di protezione e indumenti protettivi. Durante l'applicazione della poltiglia è necessario indossare guanti di protezione.
I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
- 4 Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto.
- 6 Alla fine del periodo necessario per trattamento: le serre vanno areate a lungo prima di riaccedervi.
- 7 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frazi PF

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.