



Foglio illustrativo n. 7575 / 2023

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica: Fungicida
Formulazione: SL concentrato solubile in acqua
Tenore di principi attivi: 51.7 % potassio fosfato bibasico anidro (755 g/l)
Denominazione IUPAC: KH₂PO₃ und K₂HPO₃

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi: Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto: Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

LBG-01F34

Numero di omologazione federale: F-6717
Numero di omologazione estero: 2100041

Paese di provenienza: Francia
Titolare dell'autorizzazione estera: Luxembourg Pamol (Cyprus) LTD., Cipro

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Coltivazione di bacche			
Fragola	Efficacia parziale: Marciume delle fragole	Concentrazione: 0.5 % Dosaggio: 5 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Applicazione per irrorazione.	1, 2
Fragola	Fitoftora della fragola, Marciume delle fragole, Marciume radicale della fragola	Dosaggio: 5 l/ha Applicazione: Prima della fioritura e dopo il raccolto., Annaffiare.	1
Lampone	Marciume radicale del lampone	Concentrazione: 0.4 % Dosaggio: 4 l/ha Applicazione: Prima della fioritura o dopo il raccolto, Annaffiare o irrorare.	3, 4, 5, 6
Mora	Peronospora della mora	Concentrazione: 0.4 % Dosaggio: 4 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Applicazione per irrorazione.	3, 4, 5, 7

Frutticoltura

Melo, Pero / Nashi	Efficacia parziale: Ticchiolatura della frutta a granelli	Concentrazione: 0,2 % Dosaggio: 3,2 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane Applicazione: Applicazione per irrorazione., A partire dallo stadio 76-89 (BBCH) fino a 2 settimane prima del raccolto.	8, 9
Melo, Pero / Nashi	Efficacia parziale: Ticchiolatura della frutta a granelli	Concentrazione: 0,2 % Dosaggio: 3,2 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane Applicazione: Dal germogliamento., Applicazione per irrorazione.	8, 9

Viticoltura

Vite	Efficacia parziale: Peronospora della vite	Concentrazione: 0,2 % Dosaggio: 3,2 l/ha Applicazione: Trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro metà agosto., Applicazione per irrorazione.	9, 10, 11
------	---	---	-----------

Orticoltura

Baby-Leaf (Asteraceae)	Peronospora della lattuga	Dosaggio: 3 l/ha Termine d'attesa: 14 Giorni Applicazione: Applicazione per irrorazione.	4, 12
Carciofi	Peronospora del carciofo	Dosaggio: 3,5 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Applicazione per irrorazione.	5, 13
Cetrioli	Peronospora delle Cucurbitacee	Concentrazione: 0,35 % Dosaggio: 3,5 l/ha Termine d'attesa: 15 Giorni Applicazione: In caso di rischio d'infestazione., Applicazione per irrorazione.	5, 13
Cicoria belga	Peronospora della lattuga, Pythium spp.	Dosaggio: 3,5 l/ha Termine d'attesa: 15 Giorni Applicazione: Applicazione per irrorazione.	5, 12
Insalate (Asteraceae)	Peronospora della lattuga	Dosaggio: 3 l/ha Termine d'attesa: 14 Giorni Applicazione: Applicazione per irrorazione.	4, 12
Melanzana	Peronospora della melanzana	Dosaggio: 4 l/ha Termine d'attesa: 15 Giorni Applicazione: Applicazione per irrorazione.	5, 14
Peperone	Peronospora del peperone	Dosaggio: 4 l/ha Termine d'attesa: 15 Giorni Applicazione: Applicazione per irrorazione.	5, 14
Zucche (buccia non commestibile)	Peronospora delle Cucurbitacee	Dosaggio: 3,5 l/ha Termine d'attesa: 15 Giorni Applicazione: Applicazione per irrorazione.	5, 13

Coltivazione piante ornam.

Alberi e arbusti (al di fuori della foresta)	Efficacia parziale: Malattie causate da funghi patogeni del suolo	Dosaggio: 5 l/ha Applicazione: Annaffiare.	9, 15
Culture da fiore e piante verdi	Peronospora (diverse specie) su piante ornamentali	Concentrazione: 0,5 % Applicazione: Applicazione per irrorazione.	16

Oneri generali / agronomici:

- 1 Al massimo in tutto 3 trattamenti per irrorazione e per annaffiamento per coltura e anno.
- 2 La dose indicata si riferisce allo stadio "piena fioritura fino all'inizio dell'arrossamento dei frutticini", 4 piante/m², trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.
- 3 Al massimo 2 trattamenti per anno e particella.
- 4 Trattamenti ad un intervallo di 7 - 10 giorni.
- 5 Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).
- 6 Per i lamponi estivi la dose indicata si riferisce allo stadio "inizio fioritura fino a 50% dei fiori aperti", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. Per i lamponi autunnali la dose si riferisce ad una siepe di 150 - 170 cm d'altezza, trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.
- 7 Per le more la dose indicata si riferisce allo stadio "inizio fioritura fino a 50% dei fiori aperti", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.
- 8 La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.

- 9 Al massimo 6 trattamenti per particella e anno.
- 10 Anche per applicazione per via aerea.
- 11 La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m³/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.
- 12 Al massimo 4 trattamenti per coltura.
- 13 Al massimo 3 trattamenti per coltura.
- 14 Al massimo 5 trattamenti per coltura.
- 15 prima applicazione: alla piantagione
- 16 Al massimo 6 trattamenti per coltura e anno.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frase PF

Autorizzato per l'utilizzazione non professionale.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.