



Foglio illustrativo n. 7877 / 2016

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Battericida, Fungicida
Formulazione:	WP polvere bagnabile
Tenore di principi attivi:	80 % Fosetil alluminio (Fosetyl-Al)
Denominazione IUPAC:	Aluminium-tris-(O-ethylphosphonat)
Tenore COV:	0 %

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Alstar

Numero di omologazione federale: I-3503

Paese di provenienza: Italia

Numero di omologazione estero: 4709

Titolare dell'autorizzazione estera: Bayer S.p.A., Italia

Autorizzato sino al 31.05.2021

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Coltivazione di bacche			
Fragola	Fitoftora della fragola, Marciume radicale della fragola	Concentrazione: 0.5 % Dosaggio: 5 kg/ha Applicazione: Annaffiare o irrorare.	1, 2, 3
Frutticoltura			
Pero	Efficacia parziale: Batteriosi del pero	Concentrazione: 0.3 % Dosaggio: 4.8 kg/ha Applicazione: Dal germogliamento alla sfioritura., Irrorare.	4, 5
Viticultura			
Vite	Pernospora della vite Efficacia parziale: Marciume grigio (Botrytis cinerea) Effetti secondari: Rossore parassitario	Concentrazione: 0.125 % Dosaggio: 2 kg/ha Applicazione: Trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro metà agosto., Irrorare.	6, 7, 8
Orticoltura			
Cucurbitacee	Peronospora delle Cucurbitacee	Concentrazione: 0.3 % Dosaggio: 3 kg/ha Termine d'attesa: 3 Giorni Applicazione: Irrorare.	

Insalate cappuccio	Peronospora della lattuga	Dosaggio: 2 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Irrigare.	
Coltivazione piante ornam.			
In generale	Malattie causate da funghi patogeni del suolo, Peronospora (diverse specie) su piante ornamentali	Concentrazione: 0.25 % Dosaggio: 2.5 kg/ha Applicazione: Irrigare.	
In generale	Malattie causate da funghi patogeni del suolo, Peronospora (diverse specie) su piante ornamentali	Dosaggio: 10 g/m ² Applicazione: Annaffiare.	9

Oneri generali / agronomici:

- 1 Al massimo 4 trattamenti per anno e particella.
- 2 La dose indicata si riferisce allo stadio "piena fioritura fino all'inizio dell'arrossamento dei frutticini", 4 piante/m², trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha e deve essere ricalcolata per il rispettivo stadio.
- 3 Soltanto prima della fioritura e dopo il raccolto.
- 4 La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha.
- 5 SPe 3: Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una distanza minima pari a 6 m rispetto alle acque di superficie.
- 6 La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m³/ha.
- 7 Soltanto in combinazione con 0.1% Folpet 80 WDG (1.6 kg/ha) (W 5012).
- 8 Non miscelabile con preparati a base di rame (pericolo di bruciatura delle foglie).
- 9 Applicazione solo su piante in vaso e contenitore

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frazi PF

- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.