



Foglio illustrativo n. 6503 / 2020

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fungicida
Formulazione:	WG granulare idrodispersibile
Tenore di principi attivi:	64 % Mancozeb ; 3.88 % Metalaxil-M
Denominazione IUPAC:	manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt; methyl N-(methoxyacetyl)-N-2,6-xylyl-D-alaninate

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Ridomil Gold MZ Pepite

Numero di omologazione federale: I-5428	Paese di provenienza: Italia
Numero di omologazione estero: 12383	Titolare dell'autorizzazione estera: Syngenta Crop Protection S.P.A., Italia

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Coltivazione di bacche			
Fragola	Fitoftora della fragola, Marciume radicale della fragola	Concentrazione: 0.5 % Dosaggio: 0.1 l/pianta Applicazione: Annaffiare una volta sola immediatamente dopo la piantagione in terreno umido.	1, 2, 3, 4
Lampone	Marciume radicale del lampone	Concentrazione: 0.25 - 0.5 % Dosaggio: 2.5 - 5 kg/ha Applicazione: Prima della fioritura e dopo il raccolto., Annaffiare.	1, 2, 3, 5
Mora	Mycosphaerella rubi, Peronospora della mora	Dosaggio: 2.5 - 5 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Irrorare.	1, 2, 5, 6, 7
Orticoltura			
Aglio, Cipolle, Scalogni	Peronospora della cipolla	Dosaggio: 2.5 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Irrorare.	1, 8, 9, 10
Baby-Leaf (Asteraceae)	Alternaria spp., Peronospora della lattuga, ruggini su insalate (Asteraceae) e su cicoria belga	Dosaggio: 2 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Irrorare.	1, 9, 10, 11, 12

Baby-Leaf (Chenopodiaceae)	Peronospora dello spinacio, Ticchiolatura dello spinacio	Dosaggio: 2.5 kg/ha Termine d'attesa: 2 Settimane Applicazione: Trattamento dello stadio di 4 foglie fino all'inizio dello stadio di 6 foglie., Irrorare.	1, 9, 10, 13
Erbette da cucina	Peronospora (diverse specie) su erbe da cucina	Dosaggio: 2.5 kg/ha Termine d'attesa: 2 Settimane Applicazione: Irrorare.	1, 5, 9, 10, 14
Finocchio dolce	Peronospora delle ombrellifere	Dosaggio: 2.5 kg/ha Termine d'attesa: 2 Settimane Applicazione: Irrorare.	1, 9, 10, 12, 15
Insalate (Asteraceae)	Alternaria spp., Peronospora della lattuga, ruggini su insalate (Asteraceae) e su cicoria belga	Dosaggio: 2 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Irrorare.	1, 9, 10, 11, 12
Melanzana, Pomodori	Peronospora del pomodoro, Septoriosi del pomodoro/della melanzana	Concentrazione: 0.25 % Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Irrorare.	1, 8, 9, 10
Meloni	cladosporiosi delle cucurbitacee, Peronospora delle Cucurbitacee	Dosaggio: 2 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Irrorare.	1, 9, 10, 11, 16, 17
Rabarbaro	Peronospora del rabarbaro	Dosaggio: 2.5 kg/ha Applicazione: Soltanto dopo il raccolto al più tardi fino a fine agosto., Irrorare.	1, 8, 9, 10
Rucola	Alternaria spp., Peronospora delle crucifere, Phoma, Pythium spp., Ruggine bianca	Dosaggio: 2 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Irrorare.	1, 9, 10, 11, 12
Spinaci	Peronospora dello spinacio, Ticchiolatura dello spinacio	Dosaggio: 2.5 kg/ha Termine d'attesa: 2 Settimane Applicazione: Irrorare., Trattamento dello stadio di 4 foglie fino all'inizio dello stadio di 6 foglie.	1, 9, 10, 13
Campicoltura			
Luppolo	Peronospora del luppolo	Concentrazione: 0.25 % Termine d'attesa: 2 Settimane Applicazione: Irrorare.	7, 18
Patate da tavola e da foraggio	Alternariosi delle solanacee, Peronospora della patata	Dosaggio: 2.5 kg/ha Applicazione: Irrorare.	7, 19, 20, 21, 22
Tabacco	Peronospora del tabacco	Dosaggio: 2.5 kg/ha Applicazione: Irrorare., In estate.	7
Coltivazione piante ornam.			
Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), Colture da fiore e piante verdi	Maculature fogliari, Peronospora (diverse specie) su piante ornamentali, Ruggini su piante ornamentali	Concentrazione: 0.25 % Applicazione: Irrorare.	1, 2, 23, 24
Rose	Maculature fogliari, Peronospora della rosa, Ruggine della rosa	Concentrazione: 0.25 % Applicazione: Irrorare.	1, 2, 8, 23

Oneri generali / agronomici:

- 4 Efficacia insufficiente in suoli fortemente contaminati.
- 5 Al massimo 2 trattamenti per anno e particella.
- 6 Per le more la dose indicata si riferisce allo stadio "inizio fioritura fino a 50% dei fiori aperti", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni dell'UFAG.
- 8 Al massimo 3 trattamenti per anno e particella.
- 11 1° trattamento all'inizio dell'infestazione.
- 12 Al massimo 3 trattamenti per coltura.
- 13 Spinaci invernali: 3 settimane di termine d'attesa.
- 14 1° trattamento all'inizio dell'infestazione, da ripetersi dopo 3 settimane.
- 15 Trattamenti a intervalli di 10-14 giorni.
- 16 Al massimo 6 trattamenti per coltura.
- 17 Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).
- 18 Al massimo 3 trattamenti a intervalli di 10 - 14 giorni. Alternare con un prodotto di contatto al più tardi 7 giorni dopo l'ultima applicazione di questo prodotto.
- 19 Questo prodotto contiene un fungicida a base di Fenilamide. Nei confronti di questo gruppo di fungicidi sono comparsi ceppi fungini resistenti alla peronospora della patata.
- 20 Fungicidi a base di Fenilamide: possono essere effettuati al massimo 3 trattamenti all'anno, al più tardi entro il 31 luglio. Intervalli fra le irrorazioni al massimo di 14 giorni in caso di trattamenti consecutivi.
- 21 Non applicare su patate da semina né su colture protette di patate (fogli di plastica).
- 22 1° trattamento in caso di rischio di infezione risp. su segnalazione del servizio d'allarme.
- 24 Al massimo 3 trattamenti per coltura e anno.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 1 In caso di applicazione nelle serre, queste vanno areate a lungo prima di riaccedervi.
- 2 Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto.
- 3 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. Applicazione della poltiglia mediante innaffiamento: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una visiera + un copricapo. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
- 7 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una visiera + un copricapo. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
- 9 Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi).
- 10 Durante la preparazione della poltiglia è necessario indossare guanti di protezione e indumenti protettivi. Durante l'applicazione della poltiglia è necessario indossare guanti di protezione. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
- 23 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + un copricapo. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:**Frazi PF**

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.