



Foglio illustrativo n. 7442 / 2024

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fungicida
Formulazione:	EW emulsione, olio in acqua
Tenore di principi attivi:	25.8 % Tebuconazolo (250 g/l)
Denominazione IUPAC:	(RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Tebucur 250 EW

Numero di omologazione federale: D-7421	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: 007519-63	Titolare dell'autorizzazione estera: Helm AG, Germania

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Campicoltura			
Colza	Mal dello sclerozio	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 61 - 65 (BBCH).	1, 2, 3
Colza	Marciume da phoma delle crocifere	Dosaggio: 1 - 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 20-27 o 30-31 (BBCH).	1, 2, 4
Frumento	Ruggine gialla	Dosaggio: 0.5 - 1 l/ha Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH)., All'inizio dell'attacco.	1, 3, 5
Frumento	Ruggine bruna	Dosaggio: 0.5 - 1 l/ha Applicazione: Stadi 37 - 61 (BBCH).	1, 3, 5
Frumento	Oidio dei cereali, Septoriosi della spiga (S. nodorum)	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH).	1, 3
Frumento	Fusariosi della spiga	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Stadi 55 - 69 (BBCH).	1, 3
Segale autunnale	Ruggine bruna	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: All'inizio dell'attacco., Stadi 37 - 61 (BBCH).	1, 3

Oneri generali / agronomici:

- 2 SPe 3: per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 3 Al massimo un 1 trattamento per coltura.
- 4 Al massimo un 1 trattamento per coltura: sia in autunno (dose basso) o in primavera (dose elevato).
- 5 Dose elevata soltanto per varietà fortemente sensibili.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 1 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera.
Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi.
I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:**Frase PF**

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.