



Foglio illustrativo n. 8317 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Erbicida
Formulazione:	SL concentrato solubile in acqua
Tenore di principi attivi:	35.74 % Glifosato (480 g/l) [pari a 43.78% glifosato sotto forma di sale di potassio / 588 g/l]
Denominazione IUPAC:	N-(phosphonomethyl)glycine

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Coltivazione di bacche			
Mora	Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 - 7.5 l/ha	1, 2, 3
Mora	Gramigna	Dosaggio: 2.25 - 3 l/ha	1, 2, 3
Mora	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 1.5 - 2.25 l/ha	1, 2, 3
Frutticoltura			
Frutta a granelli, Frutta a nocciolo	Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 - 7.5 l/ha Applicazione: Dal 2° anno.	1, 2, 3
Frutta a granelli, Frutta a nocciolo	Gramigna	Dosaggio: 2.25 - 3 l/ha Applicazione: Dal 2° anno.	1, 2, 3
Frutta a granelli, Frutta a nocciolo	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 1.5 - 2.25 l/ha Applicazione: Dal 2° anno.	1, 2, 3
Viticultura			
Vite in produzione	Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 - 7.5 l/ha	1, 2, 3
Vite in produzione	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 1.5 - 2.25 l/ha	1, 2, 3
Vite in produzione	Gramigna	Dosaggio: 2.25 - 3 l/ha	1, 2, 3
Orticoltura			
Maggese	Gramigna	Dosaggio: 2.5 - 3 l/ha	2, 3, 4

Maggese	Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 - 7.5 l/ha	2, 3, 4
Maggese	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 1.5 - 2.25 l/ha	2, 3, 5
Campicoltura			
Maggese	Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 - 7.5 l/ha	2, 3, 4
Maggese	Gramigna	Dosaggio: 2.25 - 3 l/ha	2, 3, 4
Maggese	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 1.5 - 2.25 l/ha	2, 3, 5
Prati e pascoli	Dicotiledoni (malerbe), Monocotiledoni (malerbe)	Concentrazione: 5 - 7.5 % Applicazione: Con vaporizzatori manuali.	2, 3, 6, 7
Prati e pascoli	Dicotiledoni (malerbe), Monocotiledoni (malerbe)	Dosaggio: 3 - 7.5 l/ha Applicazione: Trattamento su tutta la superficie prima della risemina.	2, 3, 4
Prati e pascoli	Dicotiledoni (malerbe), Monocotiledoni (malerbe)	Concentrazione: 0.5 - 1 % Applicazione: Con vaporizzatore a zaino.	2, 3, 6, 7
Semine a lattiera, Semine dopo la fresatura	Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 - 7.5 l/ha	2, 3
Semine a lattiera, Semine dopo la fresatura	Gramigna	Dosaggio: 2.25 - 3 l/ha	2, 3
Semine a lattiera, Semine dopo la fresatura	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 1.5 - 2.25 l/ha	2, 3
Coltivazione piante ornam.			
Alberi e arbusti (al di fuori della foresta)	Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 - 7.5 l/ha	1, 2, 3
Alberi e arbusti (al di fuori della foresta)	Gramigna	Dosaggio: 2.25 - 3 l/ha	1, 2, 3
Alberi e arbusti (al di fuori della foresta)	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 1.5 - 2.25 l/ha	1, 2, 3
Maggese	Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 - 7.5 l/ha	2, 3, 4
Maggese	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 1.5 - 2.25 l/ha	2, 3, 5
Maggese	Gramigna	Dosaggio: 2.25 - 3 l/ha	2, 3, 4
Selvicoltura			
Vivai forestali	Gramigna	Dosaggio: 2.25 - 3 l/ha	1, 2, 3
Vivai forestali	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 1.5 - 2.25 l/ha	1, 2, 3
Vivai forestali	Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 - 7.5 l/ha	1, 2, 3
Superfici non coltivate			
Lungo le strade nazionali e cantonali	Gramigna	Dosaggio: 2.25 - 3 l/ha Applicazione: Con vaporizzatore a zaino.	2, 3, 8
Lungo le strade nazionali e cantonali	Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 - 7.5 l/ha Applicazione: Con vaporizzatore a zaino.	2, 3, 8
Lungo le strade nazionali e cantonali	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 1.5 - 2.25 l/ha Applicazione: Con vaporizzatore a zaino.	2, 3, 8
Scarpate e strisce verdi lungo le vie di comunicazione (conformemente ORRPChim)	Gramigna	Dosaggio: 2.25 - 3 l/ha Applicazione: Con vaporizzatore a zaino.	2, 3, 9
Scarpate e strisce verdi lungo le vie di comunicazione (conformemente ORRPChim)	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 1.5 - 2.25 l/ha Applicazione: Con vaporizzatore a zaino.	2, 3, 9
Scarpate e strisce verdi lungo le vie di comunicazione (conformemente ORRPChim)	Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 - 7.5 l/ha Applicazione: Con vaporizzatore a zaino.	2, 3, 9
Superfici per la promozione della biodiversità (SPB) secondo OPD			
Superficie coltiva aperta	Convolvulaceae, Gramigna, Romice comune, Stoppione	Concentrazione: 5 - 7.5 % Applicazione: Con vaporizzatori manuali (senza vaporizzatore a zaino).	2, 3, 10
Superficie inerbita	Romice comune, Stoppione	Concentrazione: 5 - 7.5 % Applicazione: Con vaporizzatori manuali (senza vaporizzatore a zaino).	2, 3, 7, 10

Oneri generali / agronomici:

- 1 Trattamento al più tardi entro fine agosto. Non possono essere trattate le parti vegetali verdi e le vigne con sistemi di potatura corta (gobelet, cordoni permanenti, eccetera).

- 2 Non devono esserci precipitazioni durante almeno 1 ora dopo il trattamento.
- 4 Termine d'attesa necessario fino alla lavorazione del terreno o alla semina che segue: 4 giorni.
- 5 Termine d'attesa necessario fino alla lavorazione del terreno o alla semina che segue: 6 ore.
- 6 Trattamento pianta per pianta.
- 7 Pascolo o sfalcio (foraggio fresco o conservato) al più presto 3 settimane dopo il trattamento. Eccezione: per gli animali non in lattazione il termine di attesa è di 2 settimane.
- 8 Conformemente all'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, allegato 2.5): Soltanto trattamenti pianta per pianta su piante problematiche lungo le strade nazionali e cantonali, sempre che non possono essere combattute con altre misure.
- 9 Conformemente all'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, allegato 2.5), soltanto trattamenti pianta per pianta su piante problematiche su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari, sempre che non possono essere combattute con altre misure.
- 10 Per il trattamento pianta per pianta secondo l'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD).

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 3 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frase PF

Autorizzato per l'utilizzazione non professionale.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.