



Foglio illustrativo n. 6491 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica: Erbicida
Formulazione: WP polvere bagnabile
Tenore di principi attivi: 45 % Piridato
Denominazione IUPAC: 6-chloro-3-phenylpyridazin-4-yl S-octyl thiocarbonate

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi: Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto: Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Sagagran

Numero di omologazione federale: F-3886
Numero di omologazione estero: 2010374
Paese di provenienza: Francia
Titolare dell'autorizzazione estera: S.A.G.A. SA, Francia

Lentagran WP

Numero di omologazione federale: D-3818
Numero di omologazione estero: 3231-00
Paese di provenienza: Germania
Titolare dell'autorizzazione estera: Syngenta Agro GmbH, Germania

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Orticoltura			
Asparagi	Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe)	Dosaggio: 2 kg/ha Applicazione: Dopo il periodo del taglio.	1, 2, 3, 4
Cavoli a testa, Cavolo rapa	Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe)	Dosaggio: 2 kg/ha Termine d'attesa: 4 Settimane Applicazione: In post-emergenza.	1, 4, 5, 6
Cipolle, Porro, Scalogni	Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe)	Dosaggio: 2 kg/ha Termine d'attesa: 4 Settimane Applicazione: In post-emergenza dallo stadio BBCH 13.	1, 4, 5
Campicoltura			
Colza	Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe)	Dosaggio: 2 kg/ha Applicazione: In primavera.	1, 4
Mais	Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe)	Dosaggio: 1.5 - 2 kg/ha Applicazione: Stadi 12 (BBCH).	1, 4

Miscela trifoglio-graminacee (prati artificiali)	Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe)	Dosaggio: 1 - 2 kg/ha Applicazione: In autunno dopo la l'emergenza fino a metà ottobre.	1, 4, 7
Tabacco	Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe)	Dosaggio: 1 kg/ha Applicazione: 2-4 settimane dopo la piantagione.	1, 2, 4, 5

Oneri generali / agronomici:

- 1 Impiegare esclusivamente con un serbatoio per la poltiglia con miscelatore in funzione.
- 2 Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).
- 3 Trattamento sotto il fogliame della coltura.
- 5 Non mecolare con adiuvanti o con concimi fogliari.
- 6 Trattamento dopo che le colture si sono ben radicate (3-4 settimane dopo il trapianto).
- 7 Pascolo o sfalcio (foraggio fresco o conservato) al più presto 3 settimane dopo il trattamento. Eccezione: per gli animali non in lattazione il termine di attesa è di 2 settimane.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 4 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + una maschera di protezione per le vie respiratore (P2).

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frazi PF

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.