



Foglio illustrativo n. 7867 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fungicida
Formulazione:	EC concentrato emulsionato
Tenore di principi attivi:	24.2 % Tebuconazolo (250 g/l)
Denominazione IUPAC:	(RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Frutticoltura			
Albicocco, Pesco/pesco noce	Monilia dei rami e dei fiori	Concentrazione: 0.03 % Dosaggio: 0.48 l/ha Applicazione: Dalla fioritura fino allo stadio 75 BBCH (grandezza dei frutti 50%).	1, 2, 3, 4, 5, 6
Ciliegio	Monilia dei rami e dei fiori	Concentrazione: 0.03 % Dosaggio: 0.48 l/ha Applicazione: Dalla fioritura alla scamiciatura.	1, 2, 3, 4, 5, 6
Viticultura			
Vite	Oidio della vite	Concentrazione: 0.025 % Dosaggio: 0.4 l/ha Applicazione: Trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro metà agosto.	2, 5, 6, 7, 8, 9
Orticoltura			
Asparagi	Bruciatura delle foglie dell'asparago, Ruggine dell'asparago	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Giovani piantagioni e piantagioni in produzione (dopo il taglio).	6, 10, 11
Carote	Altenariosi delle carote, Oidio delle carote	Dosaggio: 0.6 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: All'inizio dell'attacco.	6, 12
Fagioli	Mal dello sclerozio, Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Inizio fioritura e piena fioritura.	6, 13, 14

Piselli	Antracnosi del pisello, Marciume grigio (Botrytis cinerea), Ruggini del pisello	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Prima dell'inizio della fioritura e in piena fioritura.	6, 13
Campicoltura			
Colza	Marciume da phoma delle crocifere Effetti secondari: Aumento della stabilità	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: In autunno., Stadi 20-27 (BBCH).	6, 15
Colza	Mal dello sclerozio	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 61 - 65 (BBCH).	6, 10, 15
Colza	Marciume da phoma delle crocifere	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 30-31 (BBCH)., In primavera.	6, 10, 15
Fava	Maculatura arancione, Ruggine della fava	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	6, 16
Frumento	Oidio dei cereali, Septoriosi della spiga (S. nodorum)	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Stadi 51 - 61 (BBCH).	6, 15
Frumento	Fusariosi della spiga	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Stadi 55 - 69 (BBCH).	6, 15, 17
Frumento	Ruggine bruna, Ruggine gialla	Dosaggio: 0.5 - 1 l/ha Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH).	6, 15, 18
Lino	Guignardia fulvida, Oidio del lino, Pasma del lino	Dosaggio: 1 l/ha	6, 10, 16
Pisello proteico	Antracnosi del pisello, Marciume grigio (Botrytis cinerea), Ruggini del pisello	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	6, 16
Segale autunnale	Ruggine bruna	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Stadi 37 - 61 (BBCH).	6, 15

Oneri generali / agronomici:

- La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha.
- SPe 3: per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.
- Al massimo 3 trattamenti per anno e particella.
- SPa 1: Per evitare l'insorgenza di resistenze, effettuare al massimo 4 trattamenti per anno e particella con prodotti contenenti principi attivi del gruppo dei ISS.
- Non trattare su uva da tavola.
- La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m³/ha.
- SPa 1: Per evitare l'insorgenza di resistenze, effettuare al massimo 3 trattamenti per anno e particella con prodotti contenenti principi attivi del gruppo dei ISS.
- SPe 3: per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.
- Al massimo 2 trattamenti per coltura e anno con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale sostanza attiva.
- Al massimo 3 trattamenti per coltura a intervalli di 2 - 3 settimane con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale sostanza attiva.
- Al massimo 2 trattamenti per coltura con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale sostanza attiva.
- In combinazione con 2 l/ha di Scala.
- Al massimo un 1 trattamento per coltura.
- Al massimo 2 trattamenti per coltura.
- Su varietà sensibili dopo una semina senza lavorazione del suolo (dopo frumento o mais).
- Dose elevata soltanto per varietà fortemente sensibili.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto.
- Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frasi PF

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.