



Foglio illustrativo n. 8136 / 2021

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica: Fungicida
Formulazione: WG granulare idrodispersibile
Tenore di principi attivi: 37.5 % Rame [sotto forma 66.7% di ossisolfato]; 1.75 % Bentiavalicarb-isopropile
Denominazione IUPAC: copper; Isopropyl[(S)-1-[[[(1R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)ethyl]carbamoyl]-2-methylpropyl]carbamate

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi: Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto: Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Vintage C Disperss

Numero di omologazione federale: F-6037 Paese di provenienza: Francia
Numero di omologazione estero: 2090130 Titolare dell'autorizzazione estera: UPL Europe Ltd, Regno Unito

Vintage C Disperss

Numero di omologazione federale: I-6036 Paese di provenienza: Italia
Numero di omologazione estero: 015832 Titolare dell'autorizzazione estera: UPL Italia S.R.L., Italia

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Viticultura			
Vite	Peronospora della vite Efficacia parziale: Marciume grigio (Botrytis cinerea), Oidio della vite Effetti secondari: Rossore parassitario	Concentrazione: 0.125 % Dosaggio: 2 kg/ha Termine d'attesa: 28 Giorni Applicazione: Dopo la fioritura, al più tardi entro metà agosto.	1, 2, 3, 4, 5

Oneri generali / agronomichi:

- 1 SPE 3: Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni dell'UFAG.
- 2 SPa 1: Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 3 trattamenti per anno e particella con prodotti dello stesso gruppo di principi attivi.
- 3 La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m²/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle Istruzioni dell'UFAG.

- 4 Al massimo 6 kg di rame-metallo per anno e per ettaro. 20 kg di rame-metallo per ettaro (bilancio del rame) nell'arco di 5 anni consecutivi.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 5 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una maschera di protezione per le vie respiratorie (P3) + occhiali di protezione.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frase PF

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.