Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Servizio di omologazione per i prodotti fitosanitari

Foglio illustrativo n. 7676 / 2023

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Battericida, Fungicida
Formulazione:	WG granulare idrodispersibile
Tenore di principi attivi:	50 % Aureobasidium pullulans [5 x 10 Exp. 9 UFC / g [ceppi DSM 14940 e DSM 14941]]
Denominazione IUPAC:	Aureobasidium pullulans DSM 14940 / DSM 14941

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Blossom Protect

Numero di omologazione federale: D-7319

Paese di provenienza: Germania

Numero di omologazione estero: 007416-00

Titolare dell'autorizzazione estera: SAN Agrow Holding GmbH,Austria

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Frutticoltura			
Frutta a granelli	Efficacia parziale: Malattie da stoccaggio	Dosaggio: 1.5 kg/ha Termine d'attesa: 3 Giorni Applicazione: Stadi 81-89 (BBCH).	1
Frutta a granelli	Fuoco batterico	Dosaggio: 1.5 kg/ha Applicazione: Stadi 61 - 69 (BBCH).	1, 2, 3, 4
Frutta a granelli	Fuoco batterico	Concentrazione: 0.15 % Applicazione: Stadi 61 - 69 (BBCH).	2, 3, 4, 5

Oneri generali / agronomici:

1 La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.

2 BlossomProtect va utilizzato in combinazione con BufferProtect o BufferProtect NT.

3 Utilizzo il giorno precedente quello critico per l¿infezione dei fiori. In caso di più giorni critici susseguenti il trattamento deve essere ripetuto ogni 2 giorni finché continuano a sbocciare nuovi fiori.

4 Nelle varietà sensibili puo causare maggiore rugginosità della buccia dei frutti.

5 La dose di applicazione indicata si riferisce a una quantità d¿acqua di 1'000 litri (alto fusto).

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna
tel. +41 58 462 85 16
psm@blv.admin.ch
www.blv.admin.ch

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:
Frasi PF

	Non respirare i aerosoli.
	Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
	Evitare il contatto con la pelle.
	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
	Può provocare sensibilizzazione per inalazione e a contatto con la pelle.
SP 1	Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.