



Foglio illustrativo n. 7843 / 2014

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fungicida
Formulazione:	SC sospensione concentrata
Tenore di principi attivi:	43.25 % Iprodione (500 g/l)
Denominazione IUPAC:	3-(3,5-dichlorophenyl)-N-isopropyl-2,4-dioxoimidazolidine-1-carboxamide
Tenore COV:	0 %

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Cluster 500

Numero di omologazione federale: I-5212	Paese di provenienza: Italia
Numero di omologazione estero: 14844	Titolare dell'autorizzazione estera: Diachem SPA, Italia

Rovral Aqua flo

Numero di omologazione federale: F-4885	Paese di provenienza: Francia
Numero di omologazione estero: 9200262	Titolare dell'autorizzazione estera: BASF Agro SAS, Francia

Autorizzato sino al 30.11.2018

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Orticoltura			
Asparagi	Bruciatura delle foglie dell'asparago	Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 0.6 - 1.6 l/ha Applicazione: Dopo il raccolto.	1, 2
Carote	Altenariosi delle carote	Concentrazione: 0.1 - 0.15 % Dosaggio: 0.6 - 1.6 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	2, 3
Cicoria belga	Alternaria spp.	Concentrazione: 0.1 - 0.15 % Dosaggio: 0.6 - 1.6 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane	2
Cicoria belga	Mal dello sclerozio, Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Concentrazione: 0.1 %	2, 4
Cipolle	Botrite della cipolla (Botrytis squamosa), Marciume del colletto di cipolla	Dosaggio: 1.5 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	3

Colture coperte: Cetrioli, Pomodori	Alternariosi delle solanacee, Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Concentrazione: 0.1 % Termine d'attesa: 3 Giorni Applicazione: Dall'inizio della fioritura.	2, 3
Indivia, Lattuga cappuccio, Lattuga romana	Mal dello sclerozio, Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Dallo stadio di 4 - 6 foglie, al più tardi 14 giorni dopo la piantagione.	2, 5
Liliacee, Ombrellifere (Apiacee), Specie di cavoli	Alternaria spp., Botrytis spp.	Dosaggio: 5 ml/kg di sementi	6
Specie di cavoli	Maculatura anulare nera del cavolo, Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Concentrazione: 0.1 - 0.15 % Dosaggio: 0.6 - 1.6 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	2, 3
Valerianella	Alternaria spp., Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: All'inizio dell'attacco.	7
Valerianella	Alternaria spp., Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Dosaggio: 5 ml/kg di sementi	8

Oneri generali / agronomici:

- 1 Al massimo 2 trattamenti per anno e particella.
- 2 È possibile osservare una perdita di efficacia su ceppi resistenti.
- 3 Al massimo 2 trattamenti per coltura.
- 4 Trattamento delle radici.
- 5 Al massimo 1 trattamento per anno e particella.
- 6 Concia delle sementi.
- 7 Al massimo un 1 trattamento per coltura.
- 8 Concia prima della semina.