



Foglio illustrativo n. 6509 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fungicida
Formulazione:	WG granulare idrodispersibile
Tenore di principi attivi:	70 % Ditianon
Denominazione IUPAC:	5,10-dihydro-5,10-dioxonaphtho[2,3-b]-1,4-dithi-in-2,3-dicarbonitrile

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Frutticoltura			
Ciliegio	Antracnosi del ciliegio, Cilindrosporiosi del ciliegio, Vaioletura della frutta a nocciolo	Concentrazione: 0.05 % Dosaggio: 0.8 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 2, 3, 4, 5
Frutta a granelli	Ticchiolatura della frutta a granelli	Concentrazione: 0.05 % Dosaggio: 0.8 kg/ha Applicazione: Dal germogliamento fino a fine giugno.	1, 2, 3, 4, 6
Prugno/Susino	Bozzacchioni del susino	Concentrazione: 0.05 % Dosaggio: 0.8 kg/ha Applicazione: Trattamento unico all'apertura delle gemme.	1, 2, 3, 4, 5
Prugno/Susino	Ruggine del susino	Concentrazione: 0.05 % Dosaggio: 0.8 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 2, 3, 4, 5
Viticultura			
Vite	Rossore parassitario	Concentrazione: 0.075 % Dosaggio: 0.6 kg/ha Applicazione: Fino a BBCH 55 (stadio G)	2, 3, 7, 8, 9, 10
Vite	Escoriosi della vite	Concentrazione: 0.075 % Dosaggio: 0.6 kg/ha Applicazione: BBCH 7-10 (Stadi C-D)	2, 3, 7, 8, 10, 11
Vite	Peronospora della vite	Concentrazione: 0.05 % Dosaggio: 0.8 kg/ha Applicazione: Trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro metà agosto.	2, 3, 7, 8, 10, 12

Coltivazione piante ornam.

Alberi e arbusti (al di fuori della foresta)	Maculature fogliari, Peronospora (diverse specie) su piante ornamentali, Ruggini su piante ornamentali	Concentrazione: 0.05 %	1, 2, 3
Azalee	Bolla dell'azalea	Concentrazione: 0.05 %	2, 3, 8
Culture da fiore e piante verdi	Maculature fogliari, Peronospora (diverse specie) su piante ornamentali, Ruggini su piante ornamentali	Concentrazione: 0.05 %	2, 3, 8
Rose	Maculature fogliari, Peronospora della rosa, Ruggine della rosa, Ticchiolatura della rosa	Concentrazione: 0.05 %	2, 3, 8

Oneri generali / agronomici:

- 1 SPe 3: Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni dell'UFAG.
- 4 La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha.
- 5 Non applicare in tutto più di 1680 g per ha della sostanza attiva ditianon per particella et anno.
- 6 Trattamenti dopo la fioritura: non applicare in tutto più di 3400 g per ha della sostanza attiva ditianon per particella et anno.
- 7 Non trattare su uva da tavola.
- 8 SPe 3: Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni dell'UFAG.
- 9 La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 55 (G), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 800 l/ha (base per il calcolo).
- 10 Al massimo 8 trattamenti per particella e anno con un prodotto contenente la sostanza attiva ditianon.
- 11 La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 07-10 (C-D), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 800 l/ha (base per il calcolo).
- 12 La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m³/ha.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 2 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
- 3 Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:**Frase PF**

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.