



Foglio illustrativo n. 8300 / 2021

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Erbicida
Formulazione:	SG granulare solubile in acqua
Tenore di principi attivi:	72 % Clopiralid
Denominazione IUPAC:	3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Lontrel 720 SG

Numero di omologazione federale: D-6517	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: 006851-00	Titolare dell'autorizzazione estera: Corteva Agriscience Germany GmbH, Germania

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Coltivazione di bacche			
Fragola	Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe)	Dosaggio: 167 g/ha Termine d'attesa: 28 Giorni Applicazione: In primavera prima della fioritura o in estate dopo il raccolto.	1, 2
Orticoltura			
Cipolle	Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe)	Dosaggio: 0.083 kg/ha Termine d'attesa: 6 Settimane Applicazione: In post-emergenza, dallo stadio di 2 foglie della coltura.	3, 4, 5
Rabarbaro	Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe)	Dosaggio: 0.167 kg/ha Applicazione: Dopo il raccolto, dopo l'emergenza delle malerbe.	5, 6, 7, 8, 9
Campicoltura			
Barbabietole da foraggio e da zucchero	Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe)	Dosaggio: 167 g/ha Termine d'attesa: 90 Giorni	7, 10
Colza autunnale	Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe)	Dosaggio: 167 g/ha Applicazione: In primavera fino allo stadio "gemme fiorali formate" (BBCH 50).	7, 11

Prati e pascoli	Cardi perenni	Concentrazione: 0.04 % Termine d'attesa: 3 Settimane	12, 13
Coltivazione piante ornam.			
Alberi e arbusti (al di fuori della foresta)	Cardi perenni	Concentrazione: 0.04 % Applicazione: Dal 3° anno., Quando i cardi sono alti 10-20 cm.	13, 14, 15
Selvicoltura			
Vivai forestali	Cardi perenni	Concentrazione: 0.04 % Applicazione: Quando i cardi sono alti 10-20 cm., Dal 3° anno.	13, 14, 15
Superfici non coltivate			
Lungo le strade nazionali e cantonali (conformemente ORRPChim)	Ambrosia	Concentrazione: 0.04 %	16
Scarpate e strisce verdi lungo le vie di comunicazione (conformemente ORRPChim)	Ambrosia , Cardi perenni	Concentrazione: 0.04 %	17
Superfici per la promozione della biodiversità (SPB) secondo OPD			
Superficie coltiva aperta	Stoppione	Concentrazione: 0.04 %	18
Superficie inerbita	Stoppione	Concentrazione: 0.04 % Termine d'attesa: 3 Settimane	12, 18

Oneri generali / agronomici:

- 1 Trattamento dopo la raccolta al più tardi fino al 15 settembre.
- 2 Al massimo 1 trattamento per coltura e anno.
- 3 Non trattare in autunno ed in inverno.
- 4 Al massimo 2 trattamenti per coltura.
- 5 Il prodotto può provocare danni alla coltura. Rispettare le misure di prevenzione fissate dal titolare dell'autorizzazione.
- 6 Durante il trattamento la coltura non deve entrare in contatto con l'erbicida. Richiesta una schermatura.
- 7 Al massimo 1 trattamento per anno e particella.
- 8 La dose si riferisce alla superficie effettiva da trattare.
- 9 Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).
- 10 Le foglie delle barbabietole trattate non devono essere impiegate per il foraggiamento di lattifere.
- 11 La copertura della coltura può provocare una diminuzione dell'efficacia del trattamento.
- 12 Pascolo o sfalcio (foraggio fresco o conservato) al più presto 3 settimane dopo il trattamento. Eccezione: per gli animali non in lattazione il termine di attesa è di 2 settimane.
- 13 Trattamento pianta per pianta.
- 14 Trattamento con campana di protezione.
- 15 In colture o varietà sensibili può provocare danni legati ad un'eventuale fitotossicità: effettuare un trattamento di prova prima del trattamento generale.
- 16 Conformemente all'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, allegato 2.5): Soltanto trattamenti pianta per pianta su piante problematiche lungo le strade nazionali e cantonali, sempre che non possono essere combattute con altre misure.
- 17 Conformemente all'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, allegato 2.5), soltanto trattamenti pianta per pianta su piante problematiche su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari, sempre che non possono essere combattute con altre misure.
- 18 Per il trattamento pianta per pianta secondo l'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD).

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frasi PF

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.