



Foglio illustrativo n. 9342 / 2024

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica: Erbicida
Formulazione: WG granulare idrodispersibile
Tenore di principi attivi: 6.83 % Pyroxsulam ; 2.28 % Florasulam ; Safener: 6.83 % Cloquintocet-mexyl [safener]
Denominazione IUPAC: N-(5,7-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonamide; 2,6,8-trifluoro-5-methoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonilide; 1-methylhexyl (5-chloroquinolin-8-yloxy)acetate

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi: Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto: Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Broadway

Numero di omologazione federale: I-7454 Paese di provenienza: Italia
Numero di omologazione estero: 13388 Titolare dell'autorizzazione estera: Corteva Agriscience Italia s.r.l., Italia

Broadway

Numero di omologazione federale: D-7393 Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: 026233-00 Titolare dell'autorizzazione estera: Corteva Agriscience Germany GmbH, Germania

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Campicoltura			
Frumento, Segale, Triticale	Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 130 - 275 g/ha Applicazione: Primavera, stadi 12-30 (BBCH).	1, 2, 3

Oneri generali / agronomici:

- 1 Trattamento con la dose inferiore fino allo stadio 32 (BBCH).
- 2 Al massimo un 1 trattamento per coltura.
- 3 SPE 3: per proteggere le piante non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frase PF

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.