



Foglio illustrativo n. 7374 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Erbicida
Formulazione:	WG granulare idrodispersibile
Tenore di principi attivi:	70 % Metamitron
Denominazione IUPAC:	4-amino-4,5-dihydro-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5-one

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Coltivazione di bacche			
Fragola	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 1.5 kg/ha Applicazione: Applicazione in autunno dopo il raccolto o dopo la piantagione	1, 2, 3, 4
Orticoltura			
Barbabietola	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 3 - 5 kg/ha Applicazione: In post-emergenza.	3, 5, 6, 7
Campicoltura			
Barbabietola da foraggio, Barbabietola da zucchero	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 3 - 5 kg/ha Applicazione: In pre-emergenza e in post-emergenza.	5, 6

Oneri generali / agronomichi:

- 1 Tener presente la sensibilità delle varietà. Quelle tolleranti devono figurare sull'etichetta.
- 4 In caso di trattamento frazionato, 2 x 1 kg/ha.
- 5 È possibile effettuare un trattamento frazionato (la dose indicata corrisponde al quantitativo totale autorizzato).
- 7 La dose d'applicazione più bassa per i suoli sabbiosi e poveri di humus; La dose più elevata per i suoli pesanti e ricchi di humus.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 2 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

- 3 Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto.
- 6 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + un copricapo. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frase PF

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.