



Foglio illustrativo n. 8584 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica: Erbicida
Formulazione: SC sospensione concentrata
Tenore di principi attivi: 36.04 % Pendimetalin (400 g/l)
Denominazione IUPAC: N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi: Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto: Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Pendiwin

Numero di omologazione federale: I-6134
Numero di omologazione estero: 016323
Paese di provenienza: Italia
Titolare dell'autorizzazione estera: Sharda Cropchem Ltd, India

Activus SC

Numero di omologazione federale: D-6524
Numero di omologazione estero: 006839-00
Paese di provenienza: Germania
Titolare dell'autorizzazione estera: ADAMA Deutschland GmbH, Germania

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Orticoltura			
Carote	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 2.5 - 4 l/ha Applicazione: In pre-emergenza.	1, 2
Cipolle, Finocchio dolce, Porro [seminato], Scorzonera	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 2 - 4 l/ha Applicazione: In pre-emergenza.	1, 2
Piselli senza baccello	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: In post-emergenza.	1, 2, 3
Porro [piantato], Sedano da coste, Sedano rapa, Specie di cavoli	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 4 - 5 l/ha Applicazione: Prima della piantagione.	1, 2
Campicoltura			
Frumento, Orzo, Segale, Spelta, Triticale	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 3 - 4 l/ha Applicazione: In autunno.	1, 2, 4

Girasole	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 3 - 4 l/ha Applicazione: Immediatamente dopo la semina.	1, 2
Kenaf	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 4 - 5 l/ha Applicazione: In pre-emergenza.	1, 2
Lupini	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 2.5 - 4 l/ha Applicazione: In pre-emergenza.	1, 2
Mais	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 3 - 5 l/ha Applicazione: In pre-emergenza.	1, 2
Miscanto	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 4 l/ha Applicazione: In post-emergenza.	1, 2
Patate	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 4 - 5 l/ha Applicazione: In pre-emergenza.	1, 2
Pisello proteico	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: In post-emergenza.	1, 2, 3
Prati e pascoli	Veronica filiforme	Dosaggio: 4 l/ha Applicazione: Autunno, dopo l'ultimo utilizzo.	1, 2
Riso seminato su terreno asciutto	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 4 - 5 l/ha Applicazione: In pre-emergenza.	1, 2
Coltivazione piante ornam.			
Colture da fiore e piante verdi	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 2.5 - 4 l/ha Applicazione: Prima trapianto o della piantagione o in primavera prima del germogliamento.	1, 2, 5

Oneri generali / agronomici:

- Non applicare su suoli sabbiosi.
- Soltanto in combinazione con 0.55-1 kg/ha Basagran SG.
- L'autorizzazione non comprende i cereali seminati a spaglio dopo la fresatura. Possono essere trattate solo cereali la cui profondità di semina risulta uniforme.
- Tener presente la sensibilità delle colture conformemente alle indicazioni del titolare dell'autorizzazione.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frase PF

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.