



Foglio illustrativo n. 7641 / 2021

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fungicida
Formulazione:	WG granulare idrodispersibile
Tenore di principi attivi:	40 % Folpet ; 5 % Mandipropamid
Denominazione IUPAC:	N-(trichloromethylthio)phthalimide; (RS)-2-(4-chlorophenyl)-N-[3-methoxy-4-(prop-2-ynyloxy)phenethyl]-2-(prop-2-ynyloxy)acetamide

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Pergado F Pepite

Numero di omologazione federale: F-6494	Paese di provenienza: Francia
Numero di omologazione estero: 2080100	Titolare dell'autorizzazione estera: Syngenta France SAS, Francia

Pergado F

Numero di omologazione federale: A-5579	Paese di provenienza: Austria
Numero di omologazione estero: 2910-1	Titolare dell'autorizzazione estera: STAR Agro Handels GmbH, Austria

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Viticultura			
Vite	Peronospora della vite Efficacia parziale: Marciume grigio (Botrytis cinerea) Effetti secondari: Escoriosi della vite, Rossore parassitario	Concentrazione: 0,2 % Dosaggio: 3,2 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro metà agosto.	1, 2, 3, 4, 5
Vite	Peronospora della vite Efficacia parziale: Marciume grigio (Botrytis cinerea) Effetti secondari: Escoriosi della vite, Rossore parassitario	Concentrazione: 0,25 % Dosaggio: 4 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro metà agosto.	2, 3, 4, 5, 6

Oneri generali / agronomici:

- 1 SPe 3: Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni dell'UFAG.
- 4 La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m²/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle Istruzioni dell'UFAG.
- 5 SPa 1: Per evitare l'insorgenza di resistenze, effettuare al massimo 3 trattamenti per anno e particella con prodotti contenenti principi attivi del gruppo dei CAA (Carboxylic acid amides).
- 6 Applicazione per via aerea.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 2 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una maschera di protezione per le vie respiratorie (P3). Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
- 3 Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:**Frase PF**

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.