



Foglio illustrativo n. 7794 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fungicida
Formulazione:	SC sospensione concentrata
Tenore di principi attivi:	20.8 % Boscalid (233 g/l); 6 % Epoxiconazol (67 g/l)
Denominazione IUPAC:	2-Chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide; (2RS,3SR)-1-[3-(2-chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)oxiran-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Bell

Numero di omologazione federale: F-6125	Paese di provenienza: Francia
Numero di omologazione estero: 2060120	Titolare dell'autorizzazione estera: BASF Agro SAS, Francia

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Campicoltura			
Frumento	Pyrenophora tritici-repentis (DTR), Ruggine bruna	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 37 - 61 (BBCH).	1, 2
Frumento, Segale autunnale, Spelta, Triticale	Septoriosi della spiga (S. nodorum), Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum)	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 37 - 61 (BBCH).	1, 2
Frumento, Segale autunnale, Triticale	Mal del piede dei cereali	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 30 - 32 (BBCH).	1, 2
Frumento, Spelta, Triticale	Oidio dei cereali, Ruggine gialla	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH).	1, 2
Orzo	Bruciature fogliari (PLS + RCC), Macchie reticolate dell'orzo, Oidio dei cereali, Rincosporiosi, Ruggine nana dell'orzo	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 31-51 (BBCH).	1, 2
Segale autunnale, Triticale	Rincosporiosi, Ruggine bruna	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 37 - 61 (BBCH).	1, 2
Spelta	Ruggine bruna	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 37 - 61 (BBCH).	1, 2

Oneri generali / agronomici:

- 2 Al massimo un 1 trattamento per coltura.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 1 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera.
Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi.
I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:**Frase PF**

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.