



Foglio illustrativo n. 7835 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica: Erbicida
Formulazione: EC concentrato emulsionato
Tenore di principi attivi: 78.4 % Prosulfocarb (800 g/l)
Denominazione IUPAC: S-benzyl dipropylthiocarbamate

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi: Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto: Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Roxy 800 EC

Numero di omologazione federale: I-6459

Paese di provenienza: Italia

Numero di omologazione estero: 14749

Titolare dell'autorizzazione estera: Globachem NV, Belgio

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Campicoltura			
Frumento autunnale, Orzo autunnale, Segale autunnale, Spelta, Triticale	Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 4 - 5 l/ha Applicazione: Autunno, primavera; in pre-emergenza; in post-emergenza precoce.	1, 2, 3
Patate	Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 - 5 l/ha Applicazione: In pre-emergenza.	1, 2, 3
Patate	Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 4 - 4.5 l/ha Applicazione: In post-emergenza.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Oneri generali / agronomichi:

- 1 Al massimo un 1 trattamento per coltura.
- 3 SPe 3: Per proteggere organismi acquatici dagli effetti di un dilavamento rispettare una zona tampone non trattata con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri dalle acque superficiali. Le eccezioni sono contemplate nelle istruzioni dell'UFAG.
- 4 Altre colture seguenti: il termine di attesa è di 16 settimane.
- 5 Soltanto per le patate da tavola e quelle da foraggio, non utilizzare su patate primaticce e da semina.
- 6 In combinazione con 0.5 kg/ha Metribuzin (70% WG).

- 7 Tener presente la sensibilità della varietà della componente della miscela.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 2 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + un copricapo. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frase PF

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.