



Foglio illustrativo n. 9291 / 2023

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fungicida
Formulazione:	SL concentrato solubile in acqua
Tenore di principi attivi:	55.7 % Propamocarb (605 g/l) [sotto forma di 66.5% di propamocarb-cloridrato(722g/l)]
Denominazione IUPAC:	propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Proplant

Numero di omologazione federale: F-2436	Paese di provenienza: Francia
Numero di omologazione estero: 9500199	Titolare dell'autorizzazione estera: Arysta Lifescience Benelux SPRL,Belgio

Pitstop

Numero di omologazione federale: I-3804	Paese di provenienza: Italia
Numero di omologazione estero: 11626	Titolare dell'autorizzazione estera: Arysta Lifescience Benelux SPRL,Belgio

Proplant

Numero di omologazione federale: I-3811	Paese di provenienza: Italia
Numero di omologazione estero: 9306	Titolare dell'autorizzazione estera: Arysta Lifescience Benelux SPRL,Belgio

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Orticoltura			
Angurie, Cetrioli, Meloni, Zucche con buccia commestibile	Peronospora delle Cucurbitacee	Dosaggio: 2 l/ha Termine d'attesa: 5 Giorni Applicazione: Irrorare.	1, 2, 3, 4
Cetrioli [piante giovani], Insalate cappuccio [piante giovani]	Malattie parassitarie dei germogli [Pythium]	Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 7.5 - 10 ml/m ² Applicazione: Annaffiare dopo il trapianto.	1, 4
Cetrioli [semine, terra da semina], Insalate cappuccio [semine, terra da semina]	Malattie parassitarie dei germogli [Pythium]	Concentrazione: 0.25 % Dosaggio: 5 - 10 ml/m ² Applicazione: Annaffiare.	1, 4

Cicoria belga	Phytophthora cryptogea	Dosaggio: 12.5 ml/hl di soluzione nutritiva Applicazione: ad inizio forzatura., aggiunta alla soluzione nutritiva	1, 5, 6
Cicoria belga	Phytophthora cryptogea	Concentrazione: 0.3 % Dosaggio: 30 ml in 10 l d'acqua/m2 Applicazione: Annaffiare.	1, 4, 6, 7
Insalate cappuccio	Peronospora della lattuga	Dosaggio: 0.6 - 1.5 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Irrigare.	1, 3, 4
Serra: Angurie, Cetrioli, Melanzana, Meloni, Peperone, Pomodori, Zucche con buccia commestibile	Mal del piede	Dosaggio: 2 l/ha Applicazione: Irrigazione a goccia.	1, 8, 9, 10
Serra: Cetrioli [sementi], Insalate cappuccio [sementi]	Malattie parassitarie dei germogli [Pythium]	Dosaggio: 10 ml/kg di sementi Applicazione: Concia (senza diluizione).	11, 12, 13

Coltivazione piante ornam.

Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), Colture da fiore e piante verdi	Peronospora (diverse specie) su piante ornamentali	Concentrazione: 0.2 % Applicazione: Irrigare.	1, 4
Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), Colture da fiore e piante verdi, Rose	Malattie causate da funghi patogeni del suolo	Concentrazione: 0.15 - 0.25 % Applicazione: Annaffiare.	1, 4
Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), Colture da fiore e piante verdi, Rose, Tappeti erbosi e terreni sportivi	Malattie causate da funghi patogeni del suolo	Concentrazione: 0.15 - 0.25 % Applicazione: Irrigare.	1, 4
Bulbi ornamentali	Malattie causate da funghi patogeni del suolo	Concentrazione: 0.3 % Applicazione: Immergere.	11, 14, 15
Rose	Peronospora della rosa	Concentrazione: 0.2 % Applicazione: Irrigare.	1, 4

Oneri generali / agronomici:

- 2 Trattamenti ad un intervallo di 7 - 10 giorni.
- 3 Al massimo 2 trattamenti per coltura.
- 5 Soltanto come aggiunta alla soluzione nutritiva.
- 6 Al massimo 1 trattamento.
- 7 Irrorazione delle radici prima della forzatura. Se questo trattamento viene effettuato, in seguito non aggiungere più il prodotto alla soluzione nutritiva.
- 8 1-2 trattamenti per coltura.
- 9 Nel trattamento si deve evitare il riflusso della soluzione nutritiva nel sistema d'irrigazione.
- 10 1° trattamento quale aggiunta alla soluzione nutritiva subito dopo la piantagione. 2° trattamento dopo 7-10 giorni.
- 13 I sacchi contenenti sementi conciate devono essere designati con la seguente iscrizione sull'etichetta:
- Sementi conciate. Non ingerire! I residui non devono essere usati come foraggio o alimento, neanche se lavati.
- La denominazione commerciale, il(i) principio(i) attivo(i) e le frasi tipo per precauzioni da prendere del prodotto per la concia delle sementi.
- 15 Gli imballaggi contenenti materiale da semina conciato devono essere designati con la seguente iscrizione sull'etichetta:
- Sementi conciate. Non ingerire! I residui non devono essere usati come foraggio o alimento, neanche se lavati.
- La denominazione commerciale, il(i) principio(i) attivo(i) e le frasi tipo per precauzioni da prendere del prodotto per la concia delle sementi.
- Per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici il materiale da semina conciato dev' essere interamente incorporato al terreno; assicurarsi che il materiale è completamente incorporato all'estremità dei solchi.
- Per proteggere uccelli e mammiferi selvatici, eliminare il materiale da semina trattato sparso.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 1 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione.
- 4 Per i lavori successivi in colture trattate indossare guanti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto.
- 11 Nel processo di concia occorre indossare guanti di protezione e indumenti protettivi.
- 12 Le etichette dei sacchi contenenti sementi conciate devono recare le seguenti indicazioni: "Nell'aprire i sacchi di sementi e nel caricare la seminatrice è necessario indossare guanti di protezione. Evitare la formazione e l'inalazione di polvere."
- 14 Le etichette dei sacchi contenenti sementi conciate devono recare le seguenti indicazioni: "Nell'utilizzo di sementi trattate occorre indossare guanti di protezione e indumenti protettivi. Evitare la formazione di polvere nell'aprire i sacchi di sementi e nel caricare la seminatrice."

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frasi PF

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.