



Foglio illustrativo n. 7117 / 2020

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Acaricida
Formulazione:	SC sospensione concentrata
Tenore di principi attivi:	10.7 % Etoxazol (110 g/l)
Denominazione IUPAC:	(RS)-5-tert-butyl-2-(2-(2,6-difluorophenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl)phenetole

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Bornéo

Numero di omologazione federale: F-5403	Paese di provenienza: Francia
Numero di omologazione estero: 9800484	Titolare dell'autorizzazione estera: PHYLAGRO France, Francia

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Coltivazione di bacche			
Fragola	Ragnetti	Concentrazione: 0.05 % Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 3 Giorni Applicazione: All'inizio dell'attacco.	1, 2
Frutticoltura			
Melo, Pero	Ragnetti	Concentrazione: 0.03 % Dosaggio: 0.48 l/ha Applicazione: Prima e dopo la fioritura, entro il 30 giugno.	2, 3, 4
Viticultura			
Vite	Acariosi della vite, Eriofide della vite	Concentrazione: 0.063 % Dosaggio: 0.5 l/ha Applicazione: Stadi BBCH 11-51 (E-F).	2, 5, 6
Orticoltura			
Melanzana, Pomodori	Ragnetti	Concentrazione: 0.05 % Termine d'attesa: 3 Giorni	2, 5

Coltivazione piante ornam.

Alberi e arbusti (al di fuori della foresta); Colture da fiore e piante verdi, Rose Ragnetti

Concentrazione: 0.05 %
Dosaggio: 0.5 l/ha
Applicazione: All'inizio dell'attacco.

2, 5

Oneri generali / agronomici:

- 1 La dose indicata si riferisce allo stadio "piena fioritura fino all'inizio dell'arrossamento dei frutticini", 4 piante/m², trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni dell'UFAG.
- 2 Al massimo 1 trattamento per anno e particella.
- 3 SPe 3: per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.
- 4 La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni dell'UFAG.
- 5 SPe 3: per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.
- 6 La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 15-51 (F), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 800 l/ha (base per il calcolo).

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frasi PF

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.