



Foglio illustrativo n. 7227 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fungicida
Formulazione:	WG granulare idrodispersibile
Tenore di principi attivi:	70 % Mancozeb ; 1.75 % Bentiavalicarb-isopropile
Denominazione IUPAC:	manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt; Isopropyl[(S)-1-[[[(1R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)ethyl]carbamoyl]-2-methylpropyl]carbamate

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Valbon

Numero di omologazione federale: D-5631	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: GP 025307-00/012	Titolare dell'autorizzazione estera: Star Agro Deutschland GmbH, Germania

Valbon

Numero di omologazione federale: D-5632	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: GP 025307-00/019	Titolare dell'autorizzazione estera: Star Agro Deutschland GmbH, Germania

Valbon

Numero di omologazione federale: A-5578	Paese di provenienza: Austria
Numero di omologazione estero: 2890/1	Titolare dell'autorizzazione estera: Star Agro Analyse und Handels GmbH, Austria

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Orticoltura			
Aglio, Cipolle, Scalogni	Peronospora della cipolla	Dosaggio: 1.5 - 2 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 2
Cicoria belga, Indivia, Lattuga cappuccio, Lattuga romana	Peronospora della lattuga	Dosaggio: 1.7 kg/ha	1, 3

Campicoltura

Patate

Alternariosi delle solanacee, Peronospora della patata

Dosaggio: 1.6 kg/ha
Termine d'attesa: 3 Settimane

1, 4, 5, 6

Oneri generali / agronomici:

- 2 Al massimo 3 trattamenti per anno.
- 3 Dose massima per ogni applicazione: 17g/ara. Applicazione soltanto per l'allevamento di piante giovani e al più tardi entro 14 giorni dopo la piantagione nell'ubicazione definitiva.
- 4 Trattamenti ad un intervallo di 7 - 10 giorni.
- 5 Al massimo 3 trattamenti per anno e particella.
- 6 Termine di attesa di 2 settimane per le patate primaticce.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 1 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frase PF

Autorizzato per l'utilizzazione non professionale.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.