



Foglio illustrativo n. 6498 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fungicida
Formulazione:	EC concentrato emulsionato
Tenore di principi attivi:	33.1 % Fluazinam (400 g/l); 16 % Metalaxil-M (194 g/l)
Denominazione IUPAC:	3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)-alpha,alpha,alpha-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine; methyl N-(methoxyacetyl)-N-2,6-xylyl-D-alaninate

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Epok 600 SC

Numero di omologazione federale: B-4236	Paese di provenienza: Belgio
Numero di omologazione estero: 9120-B	Titolare dell'autorizzazione estera: ISK Biosciences Europe N.V., Belgio

Epok

Numero di omologazione federale: D-4237	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: 4523-00	Titolare dell'autorizzazione estera: ISK Biosciences Europe N.V., Belgio

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Campicoltura			
Patate	Alternariosi delle solanacee, Peronospora della patata	Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Oneri generali / agronomici:

- 1° trattamento in caso di rischio di infezione risp. su segnalazione del servizio d'allarme.
- SPE 3: Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 4 punti come contemplato nelle istruzioni dell'UFAG.
- SPE 3: per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.
- Non applicare su patate da semina né su colture protette di patate (fogli di plastica).

- 6 Fungicidi a base di Fenilamide: possono essere effettuati al massimo 3 trattamenti all'anno, al più tardi entro il 31 luglio. Intervalli fra le irrorazioni al massimo di 14 giorni in caso di trattamenti consecutivi.
- 7 Questo prodotto contiene un fungicida a base di Fenilamide. Nei confronti di questo gruppo di fungicidi sono comparsi ceppi fungini resistenti alla peronospora della patata.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 5 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una maschera di protezione per le vie respiratore (A2) + occhiali di protezione. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frase PF

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.